

【内服痔疾用薬】

ヘモファースト錠

第2類医薬品

- ◆ ヘモファースト錠は、いぼ痔・きれ痔・痔出血といった痔疾患を改善するために考え出された内服痔疾用の生薬製剤です。
- ◆ ヘモファースト錠中のトウキ・トウニン・コウカは患部の血行を良くして痔の改善を図ります。サイコ・カンゾウ・ダイオウ・チンピ・オウバク・ソウジュツ・ショウマは痔の回復を手助けするように働きます。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 高齢者。
 - (6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。
下痢
 - (9) 次の医薬品を服用している人。
瀉下薬(下剤)
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、悪心・嘔吐、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
 - (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
軟便、下痢
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

次の場合の症状の緩和：痔核(いぼ痔)、きれ痔、痔出血

用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること。

成分・分量

本剤9錠(2.7g)中

オウバク	0.30 g	} エキス…… 1.5g
カンゾウ	0.95 g	
コウカ	1.35 g	
サイコ	1.35 g	
ショウマ	1.35 g	
ソウジュツ	2.0 g	
ダイオウ	0.35 g	
チンピ	0.50 g	
トウキ	0.675g	
トウニン	0.675g	

添加物として軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

- ・本剤は黄褐色で、特異なにおいを有し、味は苦い素錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調が異なることや、また天然生薬色素により容器・包装等が黄味を帯びることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

ヘモファースト錠は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号