

効能・効果

かゆみ、虫さされ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- (2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください
- (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください
- (4)定められた用法・用量を守ってください
- (5)薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください

成分・分量 100mL中

デキサメタゾン酢酸エステル…0.025g
 ジフェンヒドラミン塩酸塩…2.0g
 リドカイン…0.5g
 dl-カンフル…2.0g
 l-メントール…3.0g
 添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、ハアセチルシヤ糖、エタノール、その他2成分

製造番号

使用期限

クールな塗りごこち

第②類医薬品

すばやく効いてしっかり治す

かゆみ虫さされ

3つの
かゆみ止め成分の
トリプル効果



ジフェンヒドラミン塩酸塩

デキサメタゾン酢酸エステル

リドカイン

パイルスキット EX 液

50mL CAINZ

鎮痒消炎剤

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください
- (3)他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)火気に近づけないでください
- (5)メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、繊維の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください
- (6)使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください

※使用の際は薬液をスポンジに十分浸透させてから塗布してください

発売元

東光クリエート株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号
製造販売元

三友薬品株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三友薬品株式会社
03-3899-9333

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931



ここから
開けてください

ご使用に際し、外箱に記載の説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名 パイルスキットEX液 第②類医薬品

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください

(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部。(2)創傷面。(3)目や目の周囲、粘膜(例えば、口唇等)。

2. 顔面には広範囲に使用しないでください

3. 長期運用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦または妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)患部が広範囲の人。(5)湿潤やただれのひどい人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮ふ(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください