

2010年6月作成

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

鎮痛消炎プラスター剤

パスタйм[®]FX7

第2類医薬品

【特 長】

- フェルピナクを1枚あたり35mg配合した鎮痛消炎プラスター剤です。
- フェルピナクは痛みに関係する物質（プロスタグランジン）の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉の痛みにすぐれた効き目をあらわします。
- 無臭性で、人前でも気になりません。
- 基布はベージュ色で伸縮性にすぐれ、お肌によくフィットします。
- ライナーが3ピース（中央剥離方式）なので、はりやすい。



【使用上の注意】



してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる〕

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 今までに本剤によるアレルギー症状（例えば発疹、発赤、かゆみ、かぶれなど）を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜など。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 今までに薬や化粧品などによるアレルギー症状（例えば発疹、発赤、かゆみ、かぶれなど）を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹、発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれなど

- (2) 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合

【効能・効果】

関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

【用法・用量】表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付する。

用法・用量に関連する注意

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3)汗をかいたり皮膚がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
- (4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上はり、発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成分・分量】膏体 100g 中 [1枚あたり(7cm×10cm) 膏体質量 1g]

フェルピナク・・・・・・・・・・ 3.5g

添加物として l-メントール、流動パラフィン、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、その他4成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光や高温をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 誤用をさけ、品質を保証するため、他の容器に入れかえないでください。
4. 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部を折りまげ、きちんと閉めて保管してください。
5. 使用期限（箱及び薬袋に記載）をすぎた製品は使用しないでください。

【包装】7cm×10cm 7枚（7枚袋×1袋）、14枚（7枚袋×1袋）、
21枚（7枚袋×1袋）、35枚（7枚袋×1袋）

製造販売元  祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分 2596 番地 1

【お客様相談窓口】 TEL.0954-63-1320

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日は除く）