

第2類医薬品 鎮痒消炎剤

PILESKIT LOTION パイルスキット液

かゆみ 虫さされ

大容量
80mL **CAINZ**

発売元
東光クリエート株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号
製造販売元
三友薬品株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三友薬品株式会社
03-3899-9333

製造
番号

使用
期限

第2類医薬品 鎮痒消炎剤

PILESKIT LOTION パイルスキット液

かゆみ 虫さされ



すばやく効いてしっかり治す



ジフェンヒドラミン塩酸塩
リドカイン

2つの
かゆみ止め成分の
W効果。

大容量

CAINZ **80mL**

CAINZ 80mL
PILESKIT
LOTION
パイルスキット液
かゆみ
虫さされ
鎮痒消炎剤
第2類医薬品

第2類医薬品 鎮痒消炎剤

PILESKIT LOTION パイルスキット液

かゆみ 虫さされ

大容量
80mL **CAINZ**

成分・分量100mL中

ジフェンヒドラミン塩酸塩 …… 2.0 g
リドカイン …… 0.5 g
l-メントール …… 3.0 g
dl-カンフル …… 2.0 g
添加物:クエン酸水和物、ヒドロキシ
プロピルセルロース、エタノール、ア
ジピン酸ジイソプロピル、ハアセチル
しよ糖、アンモニア

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 火気に近づけないでください
- (5) メガネ、時計、アクセサリなどの金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

※使用の際は薬液をスポンジに十分浸透させてから塗布してください

ここから
開けてください

ご使用に際し、外箱に記載の説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名 パイルスキット液 第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師または薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効能・効果

かゆみ、虫さされ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください
- (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください
- (4) 定められた用法・用量を守ってください

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

