

ビタミンC配合総合かぜ薬

第2類医薬品

パイロン® 溶かしてのむかぜ薬

シオノギ製薬

- ◇ お湯または水に溶かしてのむ服用しやすいレモン味のかぜ薬です。
- ◇ 解熱鎮痛剤のアセトアミノフェンをはじめ、くしゃみ・鼻みず・鼻づまりをおさえる抗ヒスタミン剤と2種類の鎮咳剤に加え、発熱で失われやすいビタミンCや、去痰作用のある生薬のカンゾウエキスを配合し、かぜの諸症状を緩和します。



使用上の注意……

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

- 次の人は服用しないで下さい
 - 本剤によるアレルギー症状をおこしたことがある人
 - 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくをおこしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
- 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないで下さい（眠気があらわれることがあります）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい
- 服用時は飲酒しないで下さい
- 長期連用しないで下さい



相談すること

- 次の人は服用前に医師または薬剤師にご相談下さい
 - 医師または歯科医師の治療を受けている人
 - 妊婦または妊娠していると思われる人
 - 高齢者
 - 本人または家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状をおこしたことがある人
 - 次の症状のある人

高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談下さい
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさなどとともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさなどがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱をともなって、発疹・発赤、やけど様の水ぶくれなどの激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）などがあらわれる。
間質性肺炎	空せき（たんをとまわらないせき）をとまない、息切れ、呼吸困難、発熱などがあらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱などの症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜんそく	

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談下さい
- 便秘、口のかわき

……効能・効果……


かぜの諸症状（悪寒、発熱、のどの痛み、せき、たん、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

……用法・用量……

1包を約100mLのお湯又は水にとかして、食後なるべく30分以内におのみ下さい。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人（15才以上）	1 包	3 回
15才未満	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- お湯を加えて服用する場合は、やけどをしないようにご注意下さい。
- 冷水の場合は溶けにくいですが、よくかきまぜ分散させて、すぐにおのみ下さい。



……成分・分量……


パイロン 溶かしてのむかぜ薬は、褐色の散剤で、3包（4g×3・成人1日量）中に次の成分を含有しています。

成 分	含 量（3 包 中）	はたらき
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、痛みをおさえる
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりをおさえる
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せきをしずめる
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	せきをしずめ、たんの切れをよくする
無水カフェイン	75mg	痛みをおさえるはたらきを助けるほか、頭痛をやわらげる
アスコルビン酸（ビタミンC）	500mg	かぜのときに消耗しやすいビタミンCの補給
カンソウ乾燥エキス（原生薬換算量 500mg）	70mg	たんの切れをよくする

添加物として アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、クエン酸、白糖、D-ソルビトール、ポビドン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、香料を含有しています。

……保管および取り扱い上の注意……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり、品質が変化します）
- (4) 本剤は吸湿しやすい製剤です。1包を開封後は速やかに服用して下さい。また、開封状態で置いておくと粒が変色することがあります。変色した場合は服用しないで下さい。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、服用しないで下さい。



……かぜを早く治すために、次のことに心がけて下さい……

■ 安静 ・無理な仕事や外出はさける。 ・暖かくして十分な睡眠 	■ 保温 ・着衣、室温・湿度に注意 ・熱のあるときは入浴はさける。 	■ 栄養・ビタミン ・温かくカロリーの高い、消化しやすい食事 ・ビタミンの補給は抵抗力を高め、かぜの回復を早めます。 	■ のどの保護 ・禁煙と室内の湿度を適度に。 ・外出後は必ずうがい。 
---	---	--	---

……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。 塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」 電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450 受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）	「副作用被害救済制度」について （独）医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 電話 0120-149-931（フリーダイヤル）
---	---

……包 装……

パイロン 溶かしてのむかぜ薬：6包、12包

®：登録商標

販売元
塩野義製薬株式会社
大阪市中央区道修町3丁目1番8号

製造販売元
日東薬品工業株式会社
京都府向日市上植野町南開 35-3