

ビタミンC 配合総合かぜ薬

第2類医薬品

# パイロン® 溶かしてのむかぜ薬

## シオノギ製薬

- ◇ お湯または水に溶かしてのむ服用しやすいレモン味のかぜ薬です。
- ◇ 解熱鎮痛剤のアセトアミノフェンをはじめ、くしゃみ・鼻みず・鼻づまりをおさえる抗ヒスタミン剤と2種類の鎮咳剤に加え、発熱で失われやすいビタミンCや、去痰作用のある生薬のカンゾウエキスを配合し、かぜの諸症状を緩和します。



### 使用上の注意……

#### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください  
(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人  
(2) 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくをおこしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など)
- 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください(眠気などがあらわれることがあります)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用の場合は授乳を避けてください
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください  
(1) 医師または歯科医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人  
(3) 高齢者  
(4) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人  
(5) 次の症状のある人  
高熱、排尿困難  
(6) 次の診断を受けた人  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

| 関係部位  | 症 状         |
|-------|-------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | め ま い       |
| 泌 尿 器 | 排 尿 困 難     |
| そ の 他 | 過度の体温低下     |

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称                                                         | 症 状                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー)                                            | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。                                |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(スティーブンス・ジョンソン症候群)、<br>中毒性表皮壊死融解症、<br>急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がないなどが持続したり、急激に悪化する。 |
| 肝機能障害                                                         | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。                                          |
| 腎障害                                                           | 発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢などがあらわれる。                                                  |
| 間質性肺炎                                                         | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。                         |
| ぜんそく                                                          | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しいなどがあらわれる。                                                          |
| 再生不良性貧血                                                       | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿などがあらわれる。                          |
| 無顆粒球症                                                         | 突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。                                                                    |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください  
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

……効能・効果……


かぜの諸症状（悪寒、発熱、のどの痛み、せき、たん、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

……用法・用量……

1包を約100mLのお湯または水に溶かして、食後なるべく30分以内におのみください。

| 年 齢       | 1 回 量    | 1 日服用回数 |
|-----------|----------|---------|
| 成人（15才以上） | 1 包      | 3 回     |
| 15 才未満    | 服用させないこと |         |

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- お湯を加えて服用する場合は、やけどをしないようにご注意ください。
- 冷水の場合は溶けにくいですが、よくかきまぜ分散させて、すぐにおのみください。



……成分・分量……

パイロン 溶かしてのむかぜ薬は、褐色の散剤で、3包（4g×3・成人1日量）中に次の成分を含有しています。

| 成 分                    | 含量（3包中） | はたらき                       |
|------------------------|---------|----------------------------|
| アセトアミノフェン              | 900mg   | 熱を下げ、痛みをおさえる               |
| d-クロルフェニランマレイン酸塩       | 3.5mg   | くしゃみ、鼻みず、鼻づまりをおさえる         |
| ジヒドロコデインリン酸塩           | 24mg    | せきをしずめる                    |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩        | 60mg    | せきをしずめ、たんの切れをよくする          |
| 無水カフェイン                | 75mg    | 痛みをおさえるはたらきを助けるほか、頭痛をやわらげる |
| アスコルビン酸（ビタミンC）         | 500mg   | かぜのときに消耗しやすいビタミンCの補給       |
| カンゾウ乾燥エキス（原生薬換算量500mg） | 70mg    | たんの切れをよくする                 |

添加物として アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、クエン酸、白糖、D-ソルビトール、ポビドン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、香料を含有しています。

……保管および取扱い上の注意……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変化します）
- (4) 本剤は吸湿しやすい製剤です。1包を開封後は速やかに服用してください。また、開封状態で置いておくと粒が変色することがあります。変色した場合は服用しないでください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



……かぜを早く治すために、次のことに心がけてください……

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>■安静</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・無理な仕事や外出は避ける。</li><li>・暖かくして十分な睡眠</li></ul>  | <p>■保温</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・着衣、室温・湿度に注意</li><li>・熱のあるときは入浴は避ける。</li></ul>  | <p>■栄養・ビタミン</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・温かくカロリーの高い、消化しやすい食事</li><li>・ビタミンの補給は抵抗力を高め、かぜの回復を早めます。</li></ul>  | <p>■のどの保護</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・禁煙と室内の湿度を適度に。</li><li>・外出後は必ずうがい。</li></ul>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。  
塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」  
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450  
受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について  
（独）医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

®：登録商標

販売元

塩野義製薬株式会社

大阪市中央区道修町3丁目1番8号

製造販売元

日東薬品工業株式会社

京都府向日市上植野町南開 35-3