

第2類医薬品

使用に際して、この説明書を
必ず読むこと。また必要ときに
読めるよう大切に保管すること
使用期限(容器底面に記載)を過ぎた製品は
使用しないこと



販売名: アンメルツ ゴールド EX
External Anti-inflammatory / Analgesic

外用消炎鎮痛剤

特徴

- ①塗布部のステンレス製ボールでグリグリとほぐしながら薬液を塗りこめます
- ②フェルピナクが肩こり、筋肉の痛みを鎮めます
- ③血行促進成分ノナン酸バニリルアミドが、じんじんという温かな実感とともに、滞った患部の血流を改善し、肩こりや筋肉痛を和らげます
- ④すっきりと爽快な使い心地です
- ⑤ニオイが気にならない無臭性

使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人(2)ぜんそくを起こしたことがある人(3)妊婦または妊娠していると思われる人(4)15才未満の小児

2. 次の部位には使用しないこと

(1)目の周囲、粘膜など(2)湿疹、かぶれ、傷口または化膿している患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)薬や金属などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、痛み、熱感、ヒリヒリ感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる

3. 5~6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】
1日2~4回、適量を患部に塗布してください
＜用法・用量に関連する注意＞(1)目に入らないように注意する。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗う。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること(2)外用にのみ使用する ●塗布部位をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わない ●皮膚の特に弱い方は、同じところに続けて使用しない ●スポーツや入浴など、汗をかく前・後に使用した場合、ヒリヒリとした刺激、痛みや熱感が増すことがあります。これらの症状が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します

【成分・分量】100mL中

フェルピナク…3g、ノナン酸バニリルアミド…12mg、l-メントール…6g、クロルフェニラミンマレイン酸塩…100mg
添加物として、グリチルレチン酸、プロピレングリコール、ジイソプロパノールアミン、pH調整剤、BHT、エタノールを含有する

【保管および取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところ(冷暗所)にキャップをしっかりとめて立てて保管する(2)小児の手の届かないところに保管する(3)他の容器に入れ替えない(誤用の原因になったり品質が変わる) ●使用後の本容器に他の製品を詰め替えない ●キャップをしっかりとめないと液がもれることがある ●プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座など)、化繊の衣類、木材(塗料塗り家具、床など)、皮革などに液がつくと損耗したり、シミになることがあるので注意する ●衣類に付着した場合には、各衣類の洗濯表示に従って、すみやかに洗う

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎0120-5884-01

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

使用期限
および製
造番号は
容器底面
に記載



火気厳禁

アルコール類 危険等級Ⅱ
エタノール含有物 水溶性
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

MADE IN JAPAN

10135245