

あつたら
いいな
をカタチにする
小林製薬

MADE IN JAPAN 10135241

販売名:
アンメルツ ゴールド EX
External Anti-Inflammatory / Analgesic

第2類医薬品

外用消炎鎮痛剤

—【成分・分量】100mL中—

フェルビナク……………3g
ノナン酸バニリルアミド…12mg
I-メントール……………6g
クロルフェニラミンマレイン酸塩
……………100mg
添加物として、グリチルレチン酸、
プロピレングリコール、ジイソ
プロパノールアミン、pH調整
剤、BHT、エタノールを含有する

—【用法・用量】—

1日2~4回、適量を患部
に塗布してください

〈用法・用量に関する注意〉
(1)目に入らないように注意する
こと。万一、目に入った場合には、
すぐに水またはぬるま湯で洗う
こと。なお、症状が重い場合には、
眼科医の診療を受けること(2)
外用にのみ使用すること●塗布
部位をラップフィルムなどの通
気性の悪いもので覆わないこと
●皮ふの特に弱い方は、同じところ
に続けて使用しないこと●ス
ポーツや入浴など、汗をかく前後
に使用した場合、ヒリヒリとした
刺激、痛みや熱感が増すことが有
ります。これらの症状が強い場合は、
石けんで洗い流すと緩和します

火気厳禁 アルコール類 危険等級II
エタノール含有物 水溶性
副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

無臭性

小林製薬

肩こりの痛みに

アンメルツ®

ゴールドEX

鎮痛成分+血行促進成分

フェルビナク3%

ノナン酸バニリルアミド



使用に際して、この説明書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面および容器底面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【保管および取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない温氣の少ない涼しいところ(冷暗所)にキャップをしっかりと立てて保管すること(2)小児の手の届かないところに保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)●キャップをしっかりとしめないと液がもれことがある●プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座など)、化織の衣類、木材(塗料塗り家具、床など)、皮革などに液がつくと損耗したり、シミになることがあるので注意すること●衣類に付着した場合には、各衣類の洗濯表示に従って、すみやかに洗うこと製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

0120-5884-01

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3



:箱



ラベル
ボトル
キャップ

特 徴

- ① 消炎鎮痛成分フェルビナクが患部に浸透し、肩こり、筋肉の痛みを鎮めます
- ② 血行促進成分ノナン酸バニリルアミドが、じんじんという温かな実感とともに、滞った患部の血流を改善し、肩こりや筋肉痛を和らげます
- ③ I-メントール 6%配合で、爽快な使い心地です
- ④ ニオイが気にならない無臭性です
- ⑤ 手が汚れず使い易い、ヨコヨコボトルです

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)ぜんそくを起こしたことがある人 (3)妊娠または妊娠していると思われる人 (4)15才未満の小児

2. 次の部位には使用しないこと

(1)目の周囲、粘膜など (2)湿疹、かぶれ、傷口または化膿している患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、痛み、熱感、ヒリヒリ感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること