

ウレパス20DX

第2類医薬品

【効 能】 かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症)

【使用法】 1日1～数回、適量を患部に塗布してください

(1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください (2)小児(15歳未満)には使用させないでください (3)外用にのみ使用してください

【成分・分量】 100g中 尿素…20g、リドカイン…2g、ジフェンヒドラミン…1g、グリチルレチン酸…0.3g、トコフェロール酢酸エステル…0.5g

添加物：DL-アラニン、グリシン、クエン酸Na水和物、乳酸、乳酸Na、エデト酸Na水和物、セタノール、ステアリン酸ポリオキシシル、パラベン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、q-メントール、香料

発売元
東光クリエート株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号
製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

◆お問い合わせ先◆
お客様相談窓口 03-3855-0101

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください

(1)本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

(1)目のまわり、粘膜等 (2)引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位 (3)かさぶたのように皮ふがはがれている所 (4)炎症部位(ただれ・赤くはれている所)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください

(1)医師の治療を受けている人 (2)本人または家族がアレルギー体質の人 (3)薬や化粧品等によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください

(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ビリビリ感)、はれ、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

(2)2週間使用しても症状がよくならない場合

MK CUSTOMER

乾燥性皮膚の治療に

うるおい
保湿成分
尿素20%

ウレパス20DX


2つの
かゆみ止め成分
ジフェンヒドラミン
リドカイン

かゆみ
有効成分が
潤い力を
おさめ
肌肌を
にをてが


第2類医薬品

120g

皮膚やわらか成分(尿素)などが
うるおいのあるお肌になります



2種類のかゆみ止め成分が
乾燥肌によるかゆみを鎮めます



【保管および取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください (2)小児の手の届かない所に保管してください (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります) (4)キャップの閉め方が不十分な場合、クリームが乾燥し、ザラザラ感がでることがありますので、ご使用のつどキャップをきちんと閉めてください (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

製造
番号
使用
期限

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kouhouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

