



皮ふやわらか成分(尿素)などがあるお肌にします



2種類のかゆみ止め成分が乾燥肌によるかゆみを鎮めます



【保管および取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)キャップの閉め方が不十分な場合、クリームが乾燥し、ザラザラ感がでることがありますので、ご使用のつどキャップをきちんと閉めてください
- (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

※この商品は(株)マツモトキヨシホールディングスのオリジナル商品です。

発売元

東光クリエート株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元

東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

◆お問い合わせ先◆
お客様相談窓口 03-3855-0101

製造番号
使用期限

matsu
kiyo
**ウレパス20DX
2つのかゆみ止め
成分配合**

乾燥肌による かゆみに 効く!

150g
1日1回～数回

うるおい
保湿成分
尿素20%

薬のはたらき

かゆみを止める

力サ力サ肌を潤いお肌に

尿素：20g

・皮ふをしっとり軟らかくします

リドカイン：2g

・かゆみの伝達をブロックして抑えます

ジフェンヒドラミン：1g

・かゆみの元ヒスタミンを抑えます

グリチルレチン酸：0.3g

・皮ふの荒れを抑えます

トコフェロール酢酸
エステル：0.5g

・皮ふの血行をよくします

100g中

第2類医薬品

乾燥性皮膚用薬

- ・かさつく肌をなめらかにしたい方
- ・乾燥によるかゆみを止めたい方に

5つの有効成分配合

かゆみ止め成分

ジフェンヒドラミン

かゆみ止め成分

リドカイン

消炎成分

グリチルレチン酸

血行促進成分

トコフェロール酢酸エステル

保湿成分

尿素20%

【効能】かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症)

【用法】1日1～数回、適量を患部に塗擦してください

(1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科の診療を受けてください (2)小児(15歳未満)には使用させないでください (3)外用にのみ使用してください

【成 分】100g中 尿素…20g、リドカイン…2g、ジフェンヒドラミン…1g、グリチルレチン酸…0.3g、トコフェロール酢酸エステル…0.5g
添加物:DL-アラニン、グリシン、クエン酸Na水和物、乳酸、乳酸Na、エデト酸Na水和物、セタノール、ステアリン酸ポリオキシル、パラベン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、l-メントール、香料

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。

[使用上の注意]

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください

(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください

(1)目のまわり、粘膜等 (2)引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位
(3)かさぶたのように皮ふがはがれている所 (4)炎症部位(ただれ・赤くはれている所)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ピリピリ感)、はれ、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください