

【成分・分量】 30mL中
カンゾウエキス…300mg、ショウキョウ流エキス…0.33mL、麦門冬流エキス…0.1mL、ビロキシン増酸塩…10mg、ニコチン酸アミド…10mg、パンテノール…10mg、タウリン…300mg
(アルコール0.3mL以下)

添加物:エタノール、白糖、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、バニリン、ミツロウ、L-メントール

【用法・用量】 成人(15才以上)
1回1瓶(30mL)を1日3回服用して下さい。○用法・用量を厳守して下さい。○小児には服用させないで下さい。

かぜなどで**熱**が出て
体がだるい時、食欲のない時の

栄養補給・ 滋養強壮に

カンゾウエキス・ショウキョウ流エキス
麦門冬流エキス 配合

ヒストミンプラス液S

【効能】

- 病中病後・発熱性消耗性疾患・
肉体疲労・胃腸障害・栄養障害
などの場合の栄養補給
- 滋養強壮 ○虚弱体質

第3類医薬品 30mL

製造販売元 小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中郷1丁目139番地
本社所在地 東京都中央区日本橋箱崎町40番6号
お客様相談室 電話 058-278-3933

【使用上の注意】

してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 長期連用しないこと

相談すること 1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること (1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)次の症状のある人。むくみ(4)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること (1)服用後、発疹、胃部不快感、下痢の症状があらわれた場合。まれに偽アルドステロン症(尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。)の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。(2)5~6日間服用しても症状がよくなりません

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないで下さい。

ガラス:瓶、金属:キャップ

使用期限

製造番号

副作用報告救済制度 ☎ 0120-149-931

