

〔成分・分量〕30mL中
 カンゾウエキス…300mg、ショウキョウ流エキス…0.33mL、麦門冬流エキス…0.1mL、ビロドキシン塩酸塩…10mg、ニコチン酸アミド…10mg、パンテノール…10mg、タウリン…300mg（アルコール0.3mL以下）
 添加物：アルコール、白糖、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、バニリン、ミツロウ、パーメントール
 〔用法・用量〕成人（15才以上）1回1瓶（30mL）を1日3回服用してください。○用法・用量を厳守してください。○小児には服用させないでください。

かぜなどで**熱**が出て
 体がだるい時、食欲のない時の

栄養補給・ 滋養強壮に

カンゾウエキス・ショウキョウ流エキス
 麦門冬流エキス 配合

ヒストミンプラス液S

〔効能〕

- 病中病後・発熱性消耗性疾患・
 肉体疲労・胃腸障害・栄養障害
 などの場合の栄養補給
- 滋養強壮 ○虚弱体質

第2類医薬品 30mL

製造販売元 小林薬品工業株式会社
 岐阜県岐阜市中野1丁目139番地
 本社所在地 東京都中央区日本橋箱崎町40番6号
 お客様相談室 電話：058-278-3933

〔使用上の注意〕してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）長期連用しないこと

相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること ①医師の治療を受けている人。②高齢者。③むくみのある人。④高血圧、心臓病、腎臓病の診断を受けた人。2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹／消化器：胃部不快感 まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。偽アルドステロン症、ミオパチー：手足のだるさ、しびれ、つばり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 4.5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔保管及び取扱い上の注意〕

- ①直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

ガラス：瓶、金属：キャップ

使用期限

製造番号

副作用情報救済制度 0120-149-931

