

販売名：高砂カンゾウ

第3類医薬品

日本薬局方

# カンゾウ

容量 500g 刻  
Lot

袋の裏面も必ずお読みください。

4



高砂药业株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

## ■保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。

- 本品は天然品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には充分ご注意ください。

- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になつたり品質が変わることがあります。)

- 本品には品質保持(カビ・虫害防止)のため脱酸素剤を入れてあります。開封後はその効果がなくなりますので、お早めにご使用ください。
- 脱酸素剤はお召し上がりなきようお願ひいたします。

◎万一製品に異常がありましたら弊社宛御連絡ください。

## 第3類医薬品

販売名：高砂カンゾウ

### 使用上の注意

#### 【相談すること】

1. 次の人は、服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 高齢者
  - (4) 次の症状のある人
    - ・むくみ
  - (5) 次の診断を受けた人
    - ・高血圧、心臓病、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持つて医師又は薬剤師に相談してください。
  - (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルド ステロン症	尿量が減少する。 顔や手足がむくむ。 まぶたが重くなる。 手がこわばる。 血圧が高くなる。 頭痛等があらわれる。

- (2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合

【他の注意】 短期間の服用にとどめ、連用は避けてください。

#### 【効能又は効果】

激しい咳、咽喉痛の緩解

#### 【用法及び用量】

成人(15歳以上)は1日量5gを、水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、滓(カス)をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。

## 高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

お客様相談窓口 ☎ 072-977-7151

#### 副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療 ☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)  
機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/>

