

販売名：高砂カンゾウ

第2類医薬品

日本薬局方 **カンゾウ**

容量 500g

刻

Lot



袋の裏面も必ずお読みください。



高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

■保管及び取扱い上の注意

- 1 ●直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 - 2 ●小児の手の届かない所に保管してください。
 - 3 ●本品は天然品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には充分ご注意ください。
 - 4 ●他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
 - 5 ●本品は、窒素封入包装により保存性を高めてあります。開封後はその効果がなくなりますので、お早めにご使用ください。
- ◎万一製品に異常がありましたら弊社宛御連絡ください。

日本薬局方

第2類医薬品

カンゾウ

販売名：高砂カンゾウ

⚠ 使用上の注意

❌【してはいけないこと】（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

👤【相談すること】

1. 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 次の症状のある人。
むくみ
 - (5) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後は、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この記載文面を持って医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は、服用を中止し、この記載文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 激しい咳、咽喉痛の緩解

【用法・用量】

年 齢	1日量	用法・用量
成人 (15歳以上)	5g	水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、滓(カス)をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。 (食間とは食後2～3時間を指します)
15歳未満	服用しないこと	

【成分・分量】 1日量 5g 中 日本薬局方 カンゾウ 5g

高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

お客様相談窓口 ☎ 072-977-7151 (9～17時、土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>