

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

T06

アレルギー用薬

第2類医薬品

皮膚のかゆみ、湿疹、鼻炎に

アレギール錠

アレギール錠の特徴

- 抗ヒスタミン剤が皮膚のかゆみ、湿疹にすぐれた効果を発揮します。また、花粉などが原因となる鼻炎の鼻水、鼻づまりを緩和します。
- 皮膚や粘膜の健康に必要なビタミンB6を配合しています。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。
他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(眠気等があらわれることがあります)
3. 長期連用しないで下さい。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人
心臓病、高血圧、腎臓病、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。




3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
□のかわき、眠気
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

■ 効能・効果

- 皮膚のかゆみ、湿疹、じんましん、皮膚炎、かぶれ
- 鼻炎

■ 用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	3錠 	2～3回
7～14歳	2錠 	2回
4～6歳	1錠 	
4歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3) 4歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意して下さい。

成分・分量

本剤は、白色～灰白色の錠剤で、9錠中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
クロルフェニラミンマレイン酸塩	13.5mg	抗ヒスタミン作用により、かゆみや炎症をおさえます。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	22.5mg	皮膚や粘膜の健康に必要なビタミンで、皮膚炎、かゆみに用います。
グリチルリチン酸カリウム	180mg	甘草の成分で、炎症をおさえます。
グルコン酸カルシウム水和物	1350mg	じんましん、湿疹の症状をしずめます。

添加物：セルロース、カルメロースCa、タルク、ステアリン酸Mg

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4) ビンの中の詰め物は輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨てて下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電話 0120-337-336

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

T06 登録商標



製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10