

止瀉薬

第2類医薬品

廣貫堂赤玉はら薬S

廣貫堂赤玉はら薬Sは、止瀉作用のある和漢生薬のゲンノショウコ末、オウバク乾燥エキス、ヨウバイヒ末のほか、オウレン末、センブリ末、ロートエキス、動物胆の各和漢生薬を配合し、下痢、食あたり、くだり腹、腹痛を伴う下痢などに効果をあらわします。



使用上の注意



してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります〕

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
3. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(4)高齢者。
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)次の症状のある人。
排尿困難
(7)次の診断を受けた人。
心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
□のかわき、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

【効能・効果】

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

【用法・用量】

次の量を、食間に水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	20丸	3回
11歳以上15歳未満	14丸	
8 歳以上11歳未満	10丸	
5 歳以上 8 歳未満	7 丸	
3 歳以上 5 歳未満	5 丸	
3歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

【成分・分量】

1 日 量（3 包60丸） 中

成 分	分 量
ゲンノショウコ末	900mg
オウレン末	100mg
オウバク乾燥エキス	180mg （オウバク900mgに相当）
ヨウバイヒ末	500mg
センブリ末	20mg
ロートエキス	50mg
動物胆	50mg

添加物として、炭酸Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、部分アルファー化デンプン、乳糖水和物、サリチル酸、寒梅粉、タルク、酸化チタン、アラビアゴム、赤色3号、黄色5号、カラメルを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4)1 包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に使用してください。
- (5)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

■お問い合わせ先

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお願い申し上げます。

株式会社 廣貫堂 「お客様相談窓口」
電話番号：076－424－2259
受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



株式会社 廣 貫 堂

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）