

この説明文書は服用前に必ずお読みください。
また必要なとき読めるように保存しておいてください。

下痢・食あたり・水あたり

止瀉薬

第2類医薬品

こう かん どう あか だま

くすり

廣貫堂赤玉はら薬S

シオノギ製薬



使用上の注意……

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり，副作用・事故がおこりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は，次のいずれの医薬品も服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬，ロートエキスを含有する他の胃腸薬，乗物酔い薬
2. 服用後，乗物または機械類の運転操作をしないでください
(目のかすみ，異常なまぶしさなどの症状があらわれることがあります)
3. 授乳中の人には本剤を服用しないか，本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が，速くなることがあります)

相談すること



1. 次の人は服用前に医師，薬剤師または登録販売者にご相談ください
(1)医師の治療を受けている人
(2)発熱をともなう下痢のある人，血便のある人または粘液便の続く人
(3)妊婦または妊娠していると思われる人
(4)高齢者
(5)薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
(6)次の症状のある人
排尿困難
(7)次の診断を受けた人
心臓病，緑内障
2. 服用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤，かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり，異常なまぶしさ

3. 服用後，次の症状があらわれることがあるので，このような症状の持続または増強が見られた場合には，服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師または登録販売者にご相談ください
□のかわき，目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師または登録販売者にご相談ください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります

……効能・効果……

下痢，消化不良による下痢，食あたり，はき下し，水あたり，くだり腹，軟便，腹痛をともなう下痢

……用法・用量……

次の量を食間に水またはぬるま湯でおのみてください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人（15才以上）	20丸	3 回
11才以上15才未満	14丸	
8才以上11才未満	10丸	
5才以上 8 才未満	7丸	
3才以上 5 才未満	5丸	
3才未満	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には，保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 3才以上の幼児に服用させる場合には，薬剤がのどにつかえることのないよう，よく注意してください。

……成分・分量……

廣貫堂赤玉はら薬Sは，赤色の丸剤で，60丸（成人1日量）中に次の成分を含有しています。

（1包：20丸入）

成 分	含 量（60丸中）
ゲンノショウコ末	900mg
オウレン末	100mg
オウバク乾燥エキス	180mg （原生薬換算量900mg）
ヨウバイヒ末	500mg
センブリ末	20mg
ロートエキス	50mg
動物胆	50mg

添加物として 沈降炭酸カルシウム，低置換度ヒドロキシプロピルセルロース，部分アルファー化デンプン，乳糖水和物，サリチル酸，寒梅粉，タルク，酸化チタン，アラビアゴム末，赤色3号，黄色5号，カラメルを含有しています。

……保管および取扱い上の注意……

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない，涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり，品質が変化します）
- (4)1包を分割した残りを使用する場合には，袋の口を折り返して保管し，2日以内に使用してください。
- (5)使用期限をすぎた製品は，服用しないでください。

……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは，お買い求めのお店，または下記までお願いいたします。

塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」

電話：大阪 06-6209-6948，東京 03-3406-8450

受付時間：9時～17時（土，日，祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について

（独）医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931（フリーダイヤル）

販売元

塩野義製薬株式会社

大阪府中央区道修町3丁目1番8号

製造販売元

株式会社 廣 貫 堂

富山県梅沢町2丁目9番1号