

服用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

T05

ビタミンEC主薬製剤

第3類医薬品 天然型ビタミンE  
ビタミンC・B<sub>2</sub>配合

# ビトンハイ® ECB<sub>2</sub>

末梢血行障害の肩こり・冷え  
しみ、そばかすに

《ビトンハイECB<sub>2</sub>》は、

体内での効果がすぐれている天然型ビタミンEに、ビタミンC、  
持続型のビタミンB<sub>2</sub>酪酸エステルを配合した製剤です。  
ビタミンEは血行をよくするビタミンとしてよく知られており、  
また過酸化脂質の産生を防ぐ上で大切なビタミンです。

## ! 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい  
医師の治療を受けている人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、  
歯科医師又は薬剤師に相談して下さい  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、 食欲不振

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
3. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりする  
ことがあります  
出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい
4. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状  
の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師  
又は薬剤師に相談して下さい  
便秘、下痢

## ■ 効能・効果

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和  
肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 次の諸症状の緩和  
しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防  
歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が  
みられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい。」

- 次の場合のビタミンECの補給  
病中病後の体力低下時、老年期、肉体疲労時



肩・首すじのこり 日焼け・かぶれによる色素沈着 手足のしびれ・冷え

## ■ 用法・用量

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	1~3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
7歳以上11歳未満	1/2包	
7歳未満	服用しないで下さい	

なお、1日2回の場合は朝夕、3回の場合は朝昼晩に服用して下さい。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## ■ 成分

《ビトン-ハイECB<sub>2</sub>》は、芳香があり、酸味とわずかに甘味のある黄色の顆粒剤です。3包中に次の成分を含有しています。

成分	含量(3包中)
酢酸 <i>d</i> - $\alpha$ -トコフェロール(天然型ビタミンE)	300mg
アスコルビン酸(ビタミンC)	1,000mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB <sub>2</sub> 酪酸エステル)	12mg

添加物：トウモロコシデンプン、セルロース、白糖、乳糖、ポリソルベート80、ヒドロキシプロピルセルロース、香料

### 〈成分・分量に関連する注意〉

1. 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。
2. 本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは本剤中のビタミンB<sub>2</sub>酪酸エステルが吸収利用されたのち尿中に排泄されるためです。

## ■ 作用・特長

### ●効力のすぐれた成分が配合されています

天然型ビタミンE(酢酸*d*- $\alpha$ -トコフェロール)は数多くのビタミンE同族体のうち、体内での効力がすぐれています。

ビタミンB<sub>2</sub>酪酸エステルは、従来のビタミンB<sub>2</sub>にくらべ、体内での持続性にすぐれており、また血中の脂質代謝にも関与しています。

### ●過酸化脂質の増加を防ぐビタミンEが末梢血行障害を緩和します

脂肪が変質した過酸化脂質は血管などに悪影響を及ぼしますが、過酸化脂質の増加を防ぐ働きのある天然型ビタミンEは、末梢血行障害による手足のしびれや冷えを緩和します。またビタミンC・ビタミンB<sub>2</sub>酪酸エステルがその作用をたかめます。

### ●血管壁を丈夫にします

血管壁を丈夫にする作用があり、歯ぐきからの出血や鼻出血を予防します。

### ●日やけやシミなど色素の沈着を緩和します

ビタミンCは日やけやシミなど色素の沈着を緩和する作用があります。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8  
電話 03(6667)3232  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

T05®登録商標



製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo

東京都中央区日本橋小網町1-8