



キズの殺菌消毒に

マキロン®s

皮膚の修復成分配合

殺菌消毒薬

第3類医薬品

外用専用/75mL
マキロンs

効能・効果

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、
痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

成分・分量(100mL中)

ベンゼトニウム塩化物・・・0.1g

アラントイン・・・0.2g クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・0.2g

添加物:エタノール、塩化Na、pH調節剤、香料、チモール、l-メントール

製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

お問い合わせ先:お客様相談室

電話 0120-337-336

受付時間 9:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

使用前にこの説明
文書を必ずお読み下さい。

使用法: 1 日数回、患部に噴霧又は
ガーゼ・脱脂綿に浸して塗布する。〈使用法
に関連する注意〉(1)使用法を厳守すること。

(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監
督のもとに使用させること。(3)目に入らないよう
に注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水

又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼
科医の診療を受けること。(4)外用にのみ使用すること。

〈保管及び取扱い上の注意〉(1)直射日光の当たらない涼しい
所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管
すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因に
なったり品質が変わる)(4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用
しないこと。(5)持ち運びの際は、キャップが押され液が漏れるこ
とがありますので、密封できる袋等に入れて下さい。

△ 使用上の注意 △ 相談すること 1. 次の人は使用

前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりア
レルギー症状を起こしたことがある人 (3)患部が
広範囲の人 (4)深い傷やひどいやけどの人 2. 使用
後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性が
あるので、直ちに使用を中止し、本品を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談すること。皮膚:発疹
・発赤、かゆみ、はれ 3. 5~6日間使用しても症状が
よくならない場合は使用を中止し、本品を持って医
師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

本品は透明フィルムで包装しています。 ®登録商標

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

1

使用期限

製造番号

