

服用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

Y06

かぜ薬

特納用

第2類医薬品

かぜに……

新ルルエース

かぜはいろいろの原因が重なり合って発病しますので、その症状も多種多様であり、かつ複雑です。

かぜのときには早めに適切な治療をすることが、治りを早める上から大切です。

《新ルルエース》は、

鼻水・鼻づまり・熱・せき・痛み等かぜの諸症状の緩和に効果をあらわす有効成分を配合したかぜ薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

(眠気があらわれることがあります。)

4. 服用時は飲酒しないで下さい

5. 長期連用しないで下さい



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 授乳中の人
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人

- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人
高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人
心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること)
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい

口のかわき

服用前にこの説明文書
を必ずお読み下さい

かぜに……
新ルルエース

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

年 齢	1回服用量	1日服用回数
15 歳 以 上	3錠 	3回 食後なるべく30分以内に 服用して下さい
11歳以上15歳未満	2錠 	
5 歳 以上 11 歳 未 満	1錠 	
5 歳 未 満	服用しないで下さい	

＜用法・用量に関連する注意＞

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成 分

《新ルルエース》は、うすい帯茶白色の糖衣錠で、9錠（成人1日量）中の成分及び作用は次のとおりです。

成 分	含 量 (9 錠 中)	作 用
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5 mg	かぜのアレルギー症状（鼻水、くしゃみ）を抑えます
アセトアミノフェン	900 mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛みをやわらげます
無水カフェイン	90 mg	頭痛をやわらげます
ペントキシベリンクエン酸塩	48 mg	せきを鎮めます
グアヤコール スルホン酸カリウム	210 mg	たんを切れやすくします

添加物：セルロース、乳糖、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、タルク、ステアリン酸Mg、アラビアゴム、酸化チタン、ステアリン酸、白糖、フマル酸、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、ポビドン、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、カラメル、カルナウバロウ

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
4. むれた手で取り扱わないで下さい（本剤は糖衣錠のため、水分が錠剤につくと、表面の糖衣が一部溶けて、変色又はむらを生ずることがあります。）。
5. ビンの中のつめものはフタを開けた後は取り除いて下さい。
6. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電 話 03 (5205) 8331

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

ルルについて詳しくは <http://www.lulu.jp/>

Y06®登録商標



Daiichi-Sankyo

製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>