

総合感冒薬 熱・のどの痛み・鼻水

第2類医薬品

# エザックプラス

- ・熱や痛みによく効くイソプロピルアンチピリンや、のど粘膜の炎症を抑えるグリチルリチン酸など4種類の基準外成分配合で、かぜの諸症状によく効きます。
- ・発熱時に失われるビタミンC、ビタミンB<sub>2</sub>を配合しています。
- ・5歳のお子様から服用でき、飲みやすい錠剤です。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。  
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
5. 服用前後は飲酒しないでください。
6. 長期連用しないでください。

### 🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃痛
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

(裏面もご覧ください)

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

□のかわき、眠気、下痢

4. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ■効 能

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## ■用法・用量

次の1回量を、1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
15歳以上	3錠	3回
11～14歳	2錠	
5～10歳	1錠	
5歳未満の乳幼児	服用しないこと	

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3) 本剤は、内核が腸溶性の有核錠なので、かんだり、つぶしたりせずそのまま服用してください。また、制酸剤又は牛乳と同時に服用しないでください。

## ■成分・分量

エザックプラスは、9錠中、次の成分を含みます。

成 分	含 量	は た ら き
イソプロピルアンチピリン (IPA)	300mg	熱を下げ、のどの痛み・頭痛・関節の痛み・筋肉の痛みなどをおさえます。
アセトアミノフェン	450mg	
クレマスチンフマル酸塩	1.34mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりなど、かぜのアレルギー症状をおさえます。
クロベラスチンフェンジ酸塩	84mg	せきの中核にはたらき、せきをおさえます。
ノスカピン	48mg	
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげて、せきをしずめます。
l-エチルシステイン塩酸塩	300mg	気道内のたんを溶解して、ねばりけを下げ、出しやすくします。
グリチルリチン酸	39mg	のどや鼻の粘膜の炎症をしずめ、アレルギー症状をおさえます。
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。
アスコルビン酸 (ビタミンC)	500mg	発熱時に失われるビタミンCを補給します。
リボフラビン (ビタミンB <sub>2</sub> )	12mg	発熱時に失われるビタミンB <sub>2</sub> を補給します。

添加物として、リン酸水素カルシウム水和物、ヒプロメロースフタル酸エステル、ステアリン酸Mg、メタクリル酸コポリマーL、クエン酸トリエチル、タルク、トウモロコシデンプン、セルロース、カルメロース、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ケイ酸Ca、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、三酸化鉄、カルナウバロウを含有する。

※イソプロピルアンチピリンはピリン系解熱鎮痛薬で、大衆薬としてかぜ薬や解熱鎮痛薬に配合されています。

## ■保管および取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4) びんのつめものは、製品の破損を防ぐためのものです。開封後は取り除いてください。

(5) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

## ■包 装 (ビン入)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

新新薬品工業株式会社 CHC事業部 お客様相談室

T E L 076-435-0878

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

**Shin-Shin**

製造販売元 新新薬品工業株式会社 富山県富山市今市324番地