

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

T01

胃腸薬

第2類医薬品

弱った胃に効き、腸の状態を正常に近づける

第一三共胃腸薬プラス細粒

《第一三共胃腸薬プラス細粒》は、
「胃」と「腸」をダブルケアするタイプの胃腸薬です。
6つの生薬成分が弱った「胃」に効き、植物性の乳酸菌
「ラクボン」が「腸」の状態を正常に近づけます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい

透析療法を受けている人

2. 長期連用しないで下さい



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の診断を受けた人

腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい

便秘、下痢

効能・効果

- もたれ、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸つかえ、食欲不振
- 胸やけ、胃痛、胃酸過多、胃重、胃部不快感、げっぷ
- 消化不良、消化促進、胃弱、胃部・腹部膨満感
- はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐
- 整腸(便通を整える)、軟便、便秘



もたれに



整腸に

■ 用法・用量

年 齢	1回服用量	1日服用回数
15 歳 以 上	1 包	3回 食後に服用して下さい
11歳以上15歳未満	2/3 包	
8 歳以上11歳未満	1/2 包	
5 歳以上 8 歳未満	1/3 包	
3 歳以上 5 歳未満	1/4 包	
3 歳 未 満	服用しないで下さい	

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

■ 成分・分量

《第一三共胃腸薬プラス細粒》は、白色～わずかに黄褐色を帯びた白色の細粒と淡褐色～褐色の細粒の分包品で、特異なおいがあり、3包（1包1.3g）中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量 (3包中)	はたらき
タカチアスターゼN1	150mg	広いpH域で働く消化酵素で、消化を助け、栄養の吸収をよくします
リパーゼAP12	60mg	脂肪消化酵素で胃の消化機能を助けます
有孢子性乳酸菌 (ラクボン原末)	60mg	乳酸菌の孢子を製剤化したもので、安定性がよく、服用後は腸管内で繁殖して腐敗菌などの有害細菌の増殖を抑えて、整腸作用を発揮します
ケイ酸アルミン酸 マグネシウム	900mg	持続的・速効的な制酸作用により、胸やけ、げっぷなどの過酸症状を改善します
合成ヒドロタルサイト	600mg	
沈降炭酸カルシウム	600mg	
オウバク末	105mg	味や香りによって味覚を刺激し、胃液や消化液の分泌を調節し、消化を助けます
ケイヒ末	225mg	
ショウキョウ末	75mg	
チョウジ末	30mg	
ウイキョウ末	60mg	
l-メントール	9mg	
アルジオキサ	60mg	胃粘膜のあれやただれの修復を助けます
カンゾウ末	150mg	

添加物：セルロース、乳糖、ポリソルベート80、ヒドロキシプロピルセルロース、サンショウ

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
4. 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用して下さい。
5. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電 話 03 (6667) 3232

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

T01



Daiichi-Sankyo

製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋小網町1-8