

インドメシートID

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬（パップ剤を含む）
承認販売名	
製品名	インドメシートID
製品名（読み）	インドメシート I D
製品の特徴	<p>■してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)</p> <p>1.次の人は使用しないこと (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)ぜんそくを起こしたことがある人。 (3)15歳未満の小児。</p> <p>2.次の部位には使用しないこと (1)目の周囲、粘膜等。 (2)湿疹、かぶれ、傷口。 (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。</p> <p>3.連続して2週間以上使用しないこと</p>
使用上の注意	<p>■相談すること</p> <p>1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること [関係部位：症状] 皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p>
効能・効果	筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫
効能関連注意	

用法・用量	膏体面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼ってください。				
用法関連注意	(1)用法及び用量を厳守してください。 (2)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。 (3)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。 (4)多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるので、使用を控えてください。 (5)粘着テープ等でかぶれやすい人は使用しないでください。 (6)貼付後、はがす際に粘着テープと膏体部分が分離する場合がありますが、効果に影響はありません。				
成分分量	膏体100g 中 <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>インドメタシン</td> <td>0.500g</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	インドメタシン	0.500g
成分	分量				
インドメタシン	0.500g				
添加物	D-ソルビトール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、I-メントール、ポリソルベート80、pH調節剤、ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート、エタノール、モノオレイン酸ソルビタン、黄色5号				
保管及び取扱い上の注意	(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。 (2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）. (4)開封後は袋の口を折り曲げて保管してください。 (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。				
消費者相談窓口	問合せ先名：大協薬品工業株式会社 問合せ先住所：富山市水橋畠等173 問合せ先部署：お客様相談窓口 問合せ先TEL：076-479-1313 問合せ先受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）				
製造販売会社	大協薬品工業株式会社 添付文書情報 939-3521 富山県富山市水橋畠等173				
販売会社					
剤形	貼付剤				
リスク区分等	第2類医薬品				