

第2類医薬品

せき、たんに

チルデント[®]こども用せき止めシロップ

®登録商標

チルデントこども用せき止めシロップは鎮咳剤、去痰剤、抗ヒスタミン剤、生薬などの成分を配合したせき、たんのお薬です。

本剤は小児にとって服用しやすいイチゴ風味のシロップです。また、小児の誤飲などを防止するために安全キャップを採用しました。

⚠使用上の注意

本剤は小児用ですが、鎮咳去痰薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
3. 服用後、乗物又は、機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります)
4. 過量服用・長期連用しないでください
(倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります)

🗨相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)授乳中の人。
(4)高齢者。
(5)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(8)次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

- (2)5～6回服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は、増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
口のかわき

<効能・効果>

せき、たん

<用法・用量>

次の1回量を添付のカップではかり、1日3回毎食後および必要な場合には、就寝前に服用してください。

また、場合により、1日6回まで約4時間の間隔をおいて服用してください。

	8才以上 11才未満	5才以上 8才未満	3才以上 5才未満	1才以上 3才未満	3ヵ月以上 1才未満	3ヵ月未満
1回量	10mL	6.5mL	5mL	4mL	2mL	服用しないこと
						×

用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
- (4) 生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがありますが、効果には変わりありません。よく振って服用してください。

<成分・分量>

1日量（60mL）中

成 分	分 量	作 用
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	30mg	せきの中樞に作用して、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	37.5mg	気管支を広げ、せきをおさえます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	135mg	たんの切れをよくし、せきを軽くします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	せきやたんの原因となるアレルギー症状をおさえます。
カンゾウエキス (原生薬換算量260mg)	65mg	炎症を鎮めせきをおさえます。
キキョウエキス (原生薬換算量300mg)	75mg	たんの切れをよくします。
ショウキョウエキス (原生薬換算量168mg)	14mg	

添加物：白糖、クエン酸、クエン酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、プロピレングリコール、パラベン、香料、エタノール、バニリン

保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
5. 計量カップは使用のつど、よく水洗いして本剤とともに清潔に保管してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または次の所にお問い合わせください。
大昭製薬株式会社 おくすり相談室
電話 0748-88-4181
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

発 売 元 京都薬品ヘルスケア株式会社
京都市中京区西ノ京月輪町38番地

製造販売元 **大昭製薬株式会社**
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168