

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

〈化膿性皮膚疾患用薬〉
第2類医薬品

二つの抗生物質が化膿に効く テラマイシン[®] 軟膏_a

- テラマイシン軟膏_aはグラム陰性桿菌（特に緑膿菌）に効果のあるポリミキシンB硫酸塩とグラム陽性菌及び陰性菌などに広い抗菌力を示すオキシテトラサイクリン塩酸塩の2つの抗生物質を配合しています。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります】

1. 次の人には使用しないでください。
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 抗生物質によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 湿潤やただれのひどい患部
 - (2) 深い傷やひどいやけどの患部
 - (3) 目や目の周囲
3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 患部が広範囲の人
2. 次の場合は、ただちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

化膿性皮膚疾患（とびひ、めんちょう、毛のう炎）

【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部に塗布するかガーゼなどにのばして貼付してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】

テラマイシン軟膏 a は黄色の軟膏で1g中の成分・分量は次のとおりです。

成 分	分 量
オキシテトラサイクリン塩酸塩	30mg（力価）
ポリミキシン B 硫酸塩	10,000 単位

添加物として白色ワセリン、流動パラフィンを含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れかえないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります）
4. 使用期限（外箱及びチューブに記載）をすぎた製品は使用しないでください。
5. 本剤は黄色の軟膏ですので、衣服への付着に注意してください。

【包装】

テラマイシン軟膏 a 6g

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は
下記にお願い申し上げます。

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

お客様相談室： ☎0120-834389

受 付 時 間： 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931（フリーダイヤル）

【販 売 元】

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

〒101-0065 東京都千代田区西神田 3-5-2

【製造販売元】

株式会社 陽進堂

〒939-2723 富山県富山市婦中町萩島 3697番地 8号