

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

アレルギーによる鼻炎や皮膚の症状改善に

第2類
医薬品

ルキナガード

LUKINAGUARD

アレルギー用薬

ルキナガードは花粉やハウスダスト等によるアレルギー性鼻炎や食物等のアレルギーによるじんましん、湿疹・かぶれ等アレルギー症状に使用する薬剤です。
かぜ等の鼻炎症状や虫さされや化膿等による皮膚のはれ、かゆみには使用しないでください。
症状がアレルギーによるものかどうか分からない場合は、医師・薬剤師又は登録販売者に相談してください。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないこと
(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
(2)15才未満の小児
(3)妊婦又は妊娠していると思われる人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他のアレルギー用薬（皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む）、抗ヒスタミン剤を含む内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬）
- 服用時は飲酒しないこと
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気があらわれることがある)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
- 長期連用しないこと



相談すること

- 次の人は服用前に医師・薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人
(2)高齢者
(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4)アトピー性皮膚炎、またはアトピー素因があると診断を受けた人
(5)気管支ぜんそくの診断を受けた人
(6)発熱やせき、黄色で粘りのある鼻みずなどのかぜ症状がある人
(7)鼻炎の場合でアレルギー性鼻炎か、かぜによる鼻炎かわからない人または、皮膚の症状が「じんましん、湿疹・かぶれ」によるものか、虫さされや化膿等他の原因によるものかわからない人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師・薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤
消 化 器	悪心・嘔吐、口内及び口周囲のあれ、食欲不振、胸やけ、胃部不快感、腹痛
精神神経系	倦怠感、めまい、頭痛、手足のしびれ
肝 臓	全身のだるさ、皮膚や白目が黄色くなる
そ の 他	顔面のほてり、動悸、息苦しさ、鼻乾燥、頻尿、排尿困難、血尿、浮腫、月経異常

- (2)鼻炎の症状に用いる場合は1週間、皮膚の症状に用いる場合は3日間服用しても症状の改善がみられない場合

<裏面もお読みください>

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師・薬剤師又は登録販売者に相談すること
口のかわき、便秘、下痢、眠気
4. 鼻炎の症状の場合で2週間以上服用する場合は、医師・薬剤師又は登録販売者に相談して服用すること
5. じんましん、湿疹・かぶれなどの皮膚の症状の場合で、症状の軽減がみられるが、繰り返し症状が起こるなど1週間以上症状が継続する場合は、医師・薬剤師又は登録販売者に相談すること

<効能・効果>

花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：
くしゃみ、鼻みず、鼻づまり
じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和：
皮膚のはれ、かゆみ

<用法・用量>

次の量を朝食後及び就寝前に水又はお湯で服用してください。

年 令	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	2カプセル	2回
小児（15才未満）	服用しないこと	

ただし、鼻炎の症状に用いる場合は1週間、皮膚の症状に用いる場合は3日間服用しても症状の改善がみられない場合には服用を中止し、医師・薬剤師又は登録販売者に相談してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)花粉など季節性のアレルギー性鼻炎による症状に使用する場合は、花粉飛散期に入って症状が出始めたら、症状の軽い早めの時期からの服用が効果的です。
- (2)早めに飲み込んでください。長く口にとどめると苦味を感じることがあります。これは成分自身の苦味によるものです。また、服用後にも苦味を感じることがあります。
- (3)カプセルの取り出し方
右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります。）



<成分・分量>

成人1日量4カプセル中に以下の成分を含みます。

成 分	含 量	はたらき
アゼラスチン塩酸塩	2mg	アレルギー症状の原因となるヒスタミンやロイコトリエンなどの作用を抑えて、鼻や皮膚のアレルギー症状を緩和します

添加物：マクロゴール400、ゼラチン、濃グリセリン、青色1号

保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
4. ぬれた手でカプセルに触れないでください。
(カプセルの表面が溶けたり変質するおそれがあります。)
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■本製品内容についてのお問い合わせ先

おくすり相談室

電 話：0120-419-111

受付時間：10時から18時まで（土、日、祝日を除く）

発 売 元 **新日本製薬 株式会社**
福岡市中央区赤坂1-14-22

製造販売元 **株式会社 新日本医薬**
福岡市博多区吉塚8-7-11

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 電話：0120-149-931