

第2類医薬品

かぜの初期症状に 葛根湯

液体かぜ薬

葛根湯内服液「廣貫堂」

**発熱/さむけ/鼻水
のどの痛み/頭痛
肩・首筋のこわばり**

30mL

△ 使用上の注意

【**してはいけないこと**】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

【**相談すること**】1次的人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤・かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドス テロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しづれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3.5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】1日量3本(90mL) 中

葛根湯エキス……………8300mg

[カッコン 8.0g、マオウ 4.0g、タイソウ 4.0g、ケイヒ 3.0g
シャクヤク 3.0g、カンゾウ 2.0g、ショウキョウ 1.0g] エキス

添加物として、白糖、D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、エタノール、グリセリン、I-メントール、プロピレングリコール、バニリン、ベンジルアルコール、香料を含有する。

【**効能・効果**】かぜの初期の諸症状(発熱、寒け、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻閉、鼻水、のどの痛み)

【**用法・用量**】成人(15歳以上)1回1本、1日3回食間に服用してください。まれに微量の沈殿が生じる場合があるので、よく振ってから服用してください。●(1)用法・用量を厳守してください。(2)15歳未満の小兒には服用させないでください。(3)成人(15歳以上)は1回1本とし、1日3本を超えて服用しないでください。(4)本剤は1回1本の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。

【**保管及び取扱い上の注意**】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小兒の手のとどかない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 株式会社廣貫堂

富山市梅沢町2丁目9-1

(お客様相談窓口)電話076-424-2259

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

¥450+税

66A1

使用期限

製造記号