

⚠ 使用上の注意



■相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹 / 消化器：胸やけ、吐き気
- 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢
- 3.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効 能】

- 滋養強壮 ○虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

- 成人(15才以上)1日1回1瓶(50mL)を服用してください。
- 用法・用量を厳守してください。
 - 小児には服用させないでください。
 - 本剤は生薬エキスを含有していますので、まれに沈殿を生じることがありますが効果には影響ありません。よく振ってから服用してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

小林薬品工業株式会社

製造販売元 岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地
本社所在地 東京都中央区日本橋箱崎町40番6号
お客様相談室 電話：058-278-3933

肝臓 加水分解物配合 ビタミンB₂・B₆、タウリン

Liver
hydrolysate

滋養強壮・
肉体疲労時などの
栄養補給に

ゴールドユニーLV液

50mL

第3類医薬品

【成分・分量】 50mL中

肝臓加水分解物 200mg、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 200mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン 20mg、ゴミシ流エキス0.3mL(ゴミシ300mgに相当)、ジオウ流エキス0.5mL(ジオウ500mgに相当)、タウリン 1200mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム 5mg、ピリドキシン塩酸塩 10mg、ニコチン酸アミド 20mg(アルコール0.3mL以下)

添加物：カラメル、アルコール、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、安息香酸Na、バラベン、香料、プロピレングリコール、バニリン

○本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色くなることがあります。

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

ガラス：瓶
金属：キャップ

使用期限

製造番号

