

第2類医薬品

ひきはじめのかぜに

カコナル[®]II^ツ



はちみつ
ジンジャー
フレーバー

飲みやすい液体タイプ

体力中等度以上の方の
感冒の初期・鼻かぜ・頭痛に

1日2回 タイプ 45mL×2*1日分

第一三共ヘルスケア

ひきはじめのかぜに

第2類医薬品

カコナル[®]II^ツ

眠くなる成分を含まない



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1269

使用前にこの箱の説明文
書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよ
う大切に保管して下さい。

開封口

カコナルII
45mL×2本

第2類医薬品

水製抽出液葛根湯

使用上の注意 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人: むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位 症 状
皮膚 発疹・発赤、かゆみ
消化器 吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称 症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー 手足のたるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のたるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1カ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】

体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】

次の量を朝夕、食前又は食間によく振ってから服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	2回
15歳未満	服用しないで下さい。	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後のことです。

【用法・用量に関する注意】

(1) 用法・用量を厳守して下さい。
(2) 本剤は1回1本飲みきりです。
(3) 本剤は本質的に洗眼を含んでいません。

【成分・分量】 90mL(45mL×2本)中
葛根湯濃縮液・・・・81mL
(下記生薬の水製抽出液)

【日局カクコン 8g 日局マ オ ウ 4g
日局タイソウ 4g 日局ケ イ ヒ 3g
日局ジャクヤク 3g 日局カンゾウ 2g
日局ショウキョウ 1g

添加物:白糖、スクラロース、ステビアエキス、タウマチン、安息香酸Na、パラベン、香料、エタノール、グリセリン

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります) (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

(お問い合わせ先) 第一三共ヘルスケア(株) お客様相談室
電 話 03(5205)8331
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>



4 987107 612441

01®登録商標

