

ルル[®]メディカルドロップ

LULU[®] MEDICAL DROPS

はちみつレモン味

シュガーレス

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

成分・分量 12粒中

DL-メチルエフェドリン塩酸塩…………… 50mg
D-アスコルブリン酸カルシウム…………… 180mg
セチルビリジニウム塩化物水和物…………… 6mg
添加物：イソマル、グリセリン脂肪酸エステル、アセスルファミンK、
ステビア抽出物、クエン酸、L-メントール、香料、エタノール、
プロピレングリコール、パニコリン、ベンジジアルコール

効能・効果

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・
声がれ、せき、たん、喘鳴（ぜーぜー、
ひゅーひゅー）をとまらうせき

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
4. スティックパック開封後は速やかに服用して下さい。
5. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

⚠️ 使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 授乳中の人
 - (4) 高齢者
 - (5) 薬などにアレルギー症状を引き起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人：高熱

(7) 次の診断を受けた人：心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

用法・用量

成人(15歳以上)及び11歳以上	1回2粒	1日5～6回 口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用して下さい。
5歳以上11歳未満	1回1粒	2時間以上の間隔をおいて服用して下さい。
5歳未満	服用しないで下さい。	

〔用法・用量に関連する注意〕 (1) 用法・用量を厳守して下さい。
(2) 5歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

販売元 第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10
(ホームページ) <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

製造販売元
高市製薬株式会社
奈良県高市郡明日香村野口10



使用期限
製造番号

4 987107 613158

販売名：
ルルメディカルドロップH

第2類医薬品

●お問い合わせ先
第一三共ヘルスケア(株) お客様相談室
電話 0120-337-336
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

20粒



www.lulu.jp

03®登録商標