

この説明文書は服用前に必ずお読みください。
また必要なとき読めるように保存しておいてください。

IPA + ヨウ化イソプロパミド + 生薬配合 総合かぜ薬 (ピリン系) 販売名:パイロンハイ EX

第2類医薬品

パイロンハイ EX



- ◇ 解熱鎮痛効果の高いイソプロピルアンチピリン* (IPA) とアセトアミノフェンを配合していますので「熱」や「頭痛」にすぐれた効果を発揮します。
- ◇ ヨウ化イソプロパミドが過剰な鼻みずをおさえます。
- ◇ 生薬成分のカンゾウとオウヒを含む4つの成分のはたらきで「せき・たん」をおさえます。
- ◇ かぜの回復を助けるアスコルビン酸(ビタミンC)とヘスレリジンの配合がビタミンC補給を強化します。

*イソプロピルアンチピリンは、一般薬としてかぜ薬や解熱鎮痛薬に配合されている唯一のピリン系 解熱鎮痛成分です。



使用上の注意……

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
 - (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
 - (2) 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくをおこしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
 - 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など (鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など)、胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください
 - (眠気や目のかすみ、異常なまぶしさなどの症状があらわれることがあります)
4. 服用前後は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 授乳中の人
 - (4) 高齢者
 - (5) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
 - (6) 次の症状のある人
 - 高熱、むくみ、排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人
 - 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、頭痛
呼吸器	息切れ、息苦しさ
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下、顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がないなどが持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根など)のはれなどがあらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢などがあらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこぼばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しいなどがあらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿などがあらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
 □のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

……効能・効果……

かぜの諸症状（発熱、鼻みず、鼻づまり、のどの痛み、頭痛、せき、たん、悪寒、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

……用法・用量……

次の量を食後なるべく30分以内に、水またはぬるま湯でおのみください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	3錠	3回
15才未満	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守してください。

●錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っている PTP シートの凸部を指先で強く押しつけて裏面のアルミ箔を破り、取り出しておのみください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながることがあります）



……成分・分量……


パイロンハイ EX は、白色のフィルムコーティング錠で、9錠（成人1日量）中に次の成分を含有しています。

成分	含量(9錠中)	はたらき
イソプロピルアンチピリン	300mg	熱を下げ、痛みをおさえる
アセトアミノフェン	450mg	
ヨウ化イソプロパミド	6mg	過剰な鼻みずをおさえる
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりをおさえる
デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	48mg	せきをしずめる
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	せきをしずめ、たんの切れをよくする
カンゾウエキス (原生薬換算量 1000mg)	140mg	たんの切れをよくする
オウヒエキス (原生薬換算量 2000mg)	120mg	
無水カフェイン	75mg	痛みをおさえるはたらきを助けるほか、頭痛をやわらげる
ヘスペリジン	90mg	ビタミンCの吸収を助ける
直打用アスコルビン酸 (アスコルビン酸として 100mg)	103.1mg	かぜのときに消費しやすいビタミンCの補給

添加物としてトウモロコシデンプン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、タルク、酸化チタン、マクロゴール6000を含有しています。

……保管および取扱い上の注意……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) PTP シートから出して他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変化します）
- (4) 水分が錠剤に付くと、表面のコーティングの一部が溶けることがありますので、誤って水滴をおとしたり、ぬれた手で触れないようにしてください。
- (5) 一度内袋（アルミの袋）を開封した後は、品質保持の点からなるべくすみやかにご使用ください。
- (6) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
 シオノギヘルスケア株式会社「医薬情報センター」
 電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
 受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について
 (独)医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
 電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

®：登録商標

販売元

シオノギヘルスケア株式会社
 大阪市中央区北浜2丁目6番18号

製造販売元

日東薬品工業株式会社
 京都府向日市上植野町南開 35-3