

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージの側面に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

扁桃腺のはれ、のどの痛みに **ハレナース**[®]

販売名: ハレナース

口腔・咽喉用薬 第3類医薬品

特徴

- トラネキサム酸とカンゾウエキスの2つの抗炎症成分が、扁桃腺のはれを鎮めます
- 水なしでも飲めて、患部に気持ちいい冷感がとどきます

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

(1) 甘草(カンゾウ)またはその主成分グリチルリチンを含有する内服薬
(むくみ、血圧上昇および筋疾患(ミオパチー)などが起きることがある)

* (2) トラネキサム酸を含有する内服薬
(鼻炎用内服薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬など)

2. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(1) 医師または歯科医師の治療を受けている人

(2) 妊婦または妊娠していると思われる人

(3) 高齢者

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(5) 次の症状のある人: むくみ

(6) 次の診断を受けた人

高血圧、心臓病、腎臓病、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓静脈炎など)、
血栓症を起こすおそれのある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胸やけ、食欲不振もしくは食欲増進、胃部不快感、胃部膨満感
精神神経系	めまい
その他	頻尿

まれに下記の重篤な症状が起こることがある

その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

下痢

4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能・効果

扁桃炎(のどのはれ、のどの痛み)・咽頭炎、口内炎

用法・用量

次の量を朝昼晩に服用してください

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回
7才以上15才未満	1/2包	
7才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守すること
 - (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- 水なしでも服用できます

成分・分量

1日量(3包:3.9g)中

トラネキサム酸	750mg
カンゾウエキス	198mg(原生薬換算量990mg)
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	50mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	12mg
L-アスコルビン酸ナトリウム(ビタミンCナトリウム)	500mg
添加物として、エリスリトール、アルファー化デンプン、二酸化ケイ素、タルク、カラメル、無水ケイ酸、l-メントール、香料を含有する	

<成分・分量に関連する注意>

- (1)本剤に配合されているリボフラビン(ビタミンB₂)により、尿が黄色になることがあります
- (2)本剤の服用により、尿および便の検査値に影響を与えることがあります
医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください

有効成分のはたらき

トラネキサム酸	抗炎症作用があり、のどのはれ・痛みなどの症状を改善します
カンゾウエキス	主成分グリチルリチン酸の抗炎症作用で、のどのはれ・痛みなどを改善します
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆) リボフラビン(ビタミンB ₂)	粘膜の機能を正常に働かせる作用があります
L-アスコルビン酸ナトリウム (ビタミンCナトリウム)	体力消耗時のビタミンC補給になります

保管および取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管すること
- (2)小児の手の届かないところに保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)1包を分割して服用する場合、残った薬剤は袋の口を折り返して保管すること
また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服用するか捨てること

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製品のお問合せ先(お客様相談室)
☎ **0120-5884-01**
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3