

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

生薬製剤

クラシエ冠心逐瘀丹エキス顆粒

(カンシンチクオタン)

特 徴

●中年以降又は高血圧傾向のある方の頭痛、頭重、肩こり、めまい、動悸の改善を目的とした生薬製剤です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	下痢、吐き気・嘔吐、食欲不振、胃痛、腹部膨満感
そ の 他	異常出血、動悸、のぼせ、ほてり、ふらつき

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

中年以降又は高血圧傾向のあるものの次の諸症：頭痛、頭重、肩こり、めまい、動悸

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15才以上）	1 包	3 回
15才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守してください。

成 分

成人1日の服用量3包（1包1.9g）中、次の成分を含んでいます。

冠心エキス……………5,200mg

〔タンジン4.5g、シャクヤク・センキュウ・コウカ各2.25g、
モッコウ・コウブシ各1.125gより抽出。〕

添加物として、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限のすぎた商品は服用しないでください。



副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店
又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元 **クラシエ 薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）

製造販売元 **クラシエ 製薬株式会社**
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）