

## 解熱鎮痛薬

## 第②類医薬品

頭痛・生理痛  
肩こり痛に

メディペイン

メディペインはイブプロフェンに、鎮痛作用を高めるアリルイソプロピルアセチル尿素と無水カフェインを配合し、頭痛、生理痛、歯痛、肩こり痛などを効果的に鎮めます。さらに、胃粘膜保護作用のある乾燥水酸化アルミニウムゲルを加えた服用しやすい小粒のフィルムコーティング錠です。

## △ 使用上の注意

## ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

## 1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。  
(3) 15才未満の小児。(4) 出産予定日12週以内の妊婦。

## 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

## 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眠気等があらわれることがある。)

## 4. 服用前後は飲酒しないこと

## 5. 長期連用しないこと



## 相談すること

## 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病(7) 次の病気にかかったことのある人。胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病

## 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位  | 症 状                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ、青あざができる                                          |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃痛、胃部不快感、口内炎、胸やけ、胃もたれ、胃腸出血、腹痛、下痢、血便            |
| 精神神経系 | めまい                                                        |
| 循 環 器 | 動悸                                                         |
| 呼 吸 器 | 息切れ                                                        |
| そ の 他 | 目のかすみ、耳なり、むくみ、鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、背中の痛み、過度の体温低下、からだがだるい |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称                                        | 症 状                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| シ ョ ッ ク<br>(アナフィラキシー)                        | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のがすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(スティーブス・ジョンソン症候群)、<br>中毒性表皮壊死融解症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。        |
| 肝機能障害                                        | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。           |
| 腎 障 害                                        | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。             |

|         |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 無菌性髄膜炎  | 首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐等の症状があらわれる。(このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。) |
| ぜんそく    | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。                                                             |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。                             |
| 無顆粒球症   | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。                                                                       |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

便秘、眠気  
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効 能

- 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛  
○悪寒・発熱時の解熱

## 用法・用量

次の量を、水又はぬるま湯で服用してください。

| 年 齢       | 1 回 量 | 服 用 回 数                                          |
|-----------|-------|--------------------------------------------------|
| 成人(15才以上) | 2錠    | 1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。 |
| 15才未満     |       | 服用しないでください。                                      |

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



## 成分・分量 6錠中

| 成 分 名           | 分 量   | 作 用                                             |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------|
| イブプロフェン         | 450mg | 痛みや熱の元となる物質(プロスタグランジン)が作られることを抑え、解熱・鎮痛効果を発揮します。 |
| アリルイソプロピルアセチル尿素 | 180mg | 鎮痛効果を高める働きがあります。                                |
| 無水カフェイン         | 240mg | 鎮痛効果を高めるほか、頭痛を和らげます。                            |
| 乾燥水酸化アルミニウムゲル   | 200mg | 胃粘膜を保護し、胃が荒れるのを防ぎます。                            |

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、乳糖水和物、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、カルナウバロウ

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室  
電話：058-278-3933  
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

### 副作用被害救済制度の お問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元

本社所在地

# 小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鷗1丁目139番地  
東京都中央区日本橋箱崎町40番6号