

項目	内容
医薬品区分	配置用医薬品
薬効分類	解熱鎮痛薬
承認販売名	マルコミンEV
製品名	マルコミンEV
製品名（読み）	マルコミンEV
製品の特徴	マルコミンEVは、頭痛・歯痛・生理痛などの痛みや発熱にすぐれた効果を発揮するイブプロフェンと、その効果を高めるアリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェインを配合した製剤です。
使用上の注意	<p>■してはいけないこと 【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】</p> <ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用しないでください <ol style="list-style-type: none"> 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 15歳未満の小児。 出産予定日12週以内の妊婦。 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください （眠気等があらわれることがあります。） 服用前後は飲酒しないでください 長期連用しないでください <p>■相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください <ol style="list-style-type: none"> 医師又は歯科医師の治療を受けている人。 妊婦又は妊娠していると思われる人。 授乳中の人。 高齢者。 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 次の診断を受けた人。 心臓病、腎臓病、肝臓病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病 次の病気にかかったことのある人。 胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください <p>〔関係部位：症状〕 皮膚：発疹・発赤、かゆみ、青あざができる 消化器：吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃痛、口内炎、胸やけ、胃もたれ、胃腸出血、腹痛、下痢、血便 精神神経系：めまい 循環器：動悸 呼吸器：息切れ その他：目のかすみ、耳なり、むくみ、鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、背中中の痛み、過度の体温低下、からだがだるい</p> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p> <p>〔症状の名称：症状〕 ショック（アナフィラキシー）：服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症：高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。 肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 腎障害：発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。 無菌性髄膜炎：首筋のつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐等があらわれる。（このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。） 心筋梗塞：しめ付けられるような胸の痛み、息苦しい、冷や汗が出る。※ 脳血管障害：意識の低下・消失、片側の手足が動かしくくなる、頭痛、嘔吐、めまい、しゃべりにくくなる、言葉が出にくくなる等が急にあらわれる。※ ぜんそく：息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。 再生不良性貧血：青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。 無顆粒球症：突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。</p> <ol style="list-style-type: none"> 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 便秘、眠気 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> ○頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・のどの痛み・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛 ○悪寒・発熱時の解熱

効能関連注意									
用法・用量	<p>次の量を、1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて、水又は白湯にて服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。</p> <p>[年齢：1回量：1日服用回数] 成人（15歳以上）：2錠：3回を限度 15歳未満：服用しないでください</p>								
用法関連注意	<p>(1) 用法・用量を厳守してください。 (2) 錠剤の取り出し方 右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。 (誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)</p>								
成分分量	<p>1日量（6錠）中</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イブプロフェン</td> <td>450mg</td> </tr> <tr> <td>アリルイソプロピルアセチル尿素</td> <td>180mg</td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td>240mg</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	イブプロフェン	450mg	アリルイソプロピルアセチル尿素	180mg	無水カフェイン	240mg
成分	分量								
イブプロフェン	450mg								
アリルイソプロピルアセチル尿素	180mg								
無水カフェイン	240mg								
添加物	セルロース、乳糖水和物、無水ケイ酸、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、カルナウバロウ								
保管及び取扱い上の注意	<p>(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。 (3) 他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わります。) (4) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。</p>								
消費者相談窓口	<p>会社名：株式会社廣貴堂 問い合わせ先：お客様相談窓口 電話番号：076-424-2259 受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）</p>								
製造販売会社	<p>株式会社廣貴堂 添付文書情報 会社名：株式会社廣貴堂 住所：富山市梅沢町2丁目9-1</p>								
販売会社									
剤形	錠剤								
リスク区分等	第「2」類医薬品								