

絞り出しやすい
ラミネートチューブ

【成分・分量】100g中
インドメタシン…1,000mg
L-メントール……3,000mg
添加物:イソプロパノール、マ
クロゴール、中鎖脂肪酸トリグ
リセリド、プロピレングリコー
ル、ポリソルベート80、ミス
チン酸イソプロピル、ポリオキ
シエチレン硬化ヒマシ油、ポリ
オキシエチレンポリオキシブ
ロピレンセチルエーテル、カル
ボキシビニルポリマー、ヒプロ
メロース、チオ硫酸Na水和物、
亜硫酸水素Na、pH調節剤

【保管及び取扱上の注意】
(1)直射日光の当たらない湿気の
少ない涼しい所に密栓して保管し
てください。(2)小児の手の届か
ない所に保管してください。(3)他
の容器に入れかえないでくださ
い。(誤用の原因になったり品質が
変わることがあります。)(4)メガネ、
時計、アクセサリー等の金属類、化
織の衣類、プラスチック類、床や家
具などの塗装面等に付着すると変
質することがありますので、付着し
ないように注意してください。(5)本
剤のついた手で、目などの粘膜に
ふれないでください。(6)使用期
限(外箱及びチューブに記載)を過
ぎた製品は使用しないでくださ
い。(7)低温下では成分の一部が
固まる可能性があるため、冷蔵庫
での保管はさけてください。

インドメタシン 1.0%配合

肩・腰・ひざ・筋肉のつらい

痛み

ミリリーゲル 80g

インテミルリーゲル1%



滑らかで
刺激が少ない

L-メントール 3%

第2類医薬品

塩野 暁雄
濠田 尚

セルフmedication
税 控除対象

こちら
開けてください

第2類医薬品



経皮吸収型消炎鎮痛剤
販売名 インテミルリーゲル1%

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなる)

- 次の人は使用しないでください
(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー
症状を起こしたことがある人。
(2)ぜんそくを起こしたことがある人。
- 次の部位には使用しないでください
(1)目の周囲、粘膜等。
(2)湿疹、かぶれ、傷口。
(3)みずむし・たむし等または化膿している
患部。
- 長期連用しないでください

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販
売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦または妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたこ
とがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用
の可能性があるので、直ちに使用を中止し、
この説明文書を持って医師、薬剤師または登録
販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、 熱感、乾燥感

- 5〜6日間使用しても症状がよくなる場合は
使用を中止し、この説明文書を持って医師、
薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、
腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首
の痛み)、肘の痛み(テニス肘
など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日4回を限度として適量を
患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 11歳以上の小児に使用さ
せる場合には、保護者の指導監
督のもとに使用させてくださ
い。(2)11歳未満の小児には使
用させないでください。(3)目
に入らないよう注意してくださ
い。万一、目に入った場合には、
すぐに水またはぬるま湯で洗っ
てください。なお、症状が重い
場合には、眼科医の診療を受
けてください。(4)外用にのみ
使用してください。(5)1週間当
たり50gを超えて使用しないで
ください。(6)薬剤塗擦後の患
部をラップフィルムなどの通
気性の悪いもので覆わないで
ください。(7)定められた用法・
用量をお守りください。

発売元
東光クリエート株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号
製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

◆お問い合わせ先◆
お客様相談窓口 03-3855-0101

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931