この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

漢方製剤　第2類医薬品

排膿散及湯エキス〔細粒〕52

本方は、排膿散と排膿湯を合方した処方で、体力の程度に関わらず用いることができます。炎症を鎮め、その名前のとおり膿を排出する働きがありますので、化膿性の皮膚病や歯肉炎などに奏効します。

⚠ ●使用上の注意●

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師、歯科医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)高齢者
(4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
(5)次の症状のある人　むくみ
(6)次の診断を受けた人　高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症　状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症　状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

5. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもありますので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

（裏面につづく）

●効能・効果●

化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎

〔効能・効果に関連する注意〕

体力に関わらず、使用できます。

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。

（食間とは食後2～3時間を指します。）

年　齢	1回量		1日服用回数
	分包剤	大入り剤	
成人（15歳以上）	1包	2.0g	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	1.3g	
7歳未満4歳以上	1/2包	1.0g	
4歳未満2歳以上	1/3包	0.7g	
2歳未満	1/4包	0.5g以下	

〔用法・用量に関連する注意〕

⑴用法・用量を厳守してください。

⑵小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

⑶1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

●成分・分量●

本品3包（6.0g）又は6.0gは

キキョウ……2g　シャクヤク……1.5g
カンゾウ……1.5g　ショウキョウ……0.25g
タイソウ……1.5g　キジツ……1g

上記より製した排膿散及湯エキス3.7g（乾燥物換算で約1.85gに相当）を含有する細粒剤です。添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、デキストリン、軽質無水ケイ酸、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

⑴直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。

⑵小児の手の届かない所に保管してください。

⑶他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）

⑷本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。

⑸分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

⑹使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦漢方株式会社　薬事学術部
TEL（052）883-5131　受付時間 10：00～17：00（土·日·祝日を除く）

発売元
松浦漢方株式会社
名古屋市昭和区円上町24–21

製造販売元
松浦薬業株式会社
名古屋市緑区大高町寅新田36