

この添付文書は、本剤をご使用になる前に、かならずお読みください。  
又ご使用になる際は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

第②類医薬品

# ドニーセキ止めP

せきは、のどや気管支の病気に伴って起こる症状で、せきが長く続くと、のどを痛めたり、声がかれるだけでなく肺に必要以上の刺激を与え、血圧を高くし、又心臓に負担を与えるなどの体力が著しく消耗し、病気に対する抵抗力も弱ってきます。ドニーセキ止めPは、せき、たんに効果のある生薬の「キキョウ」、「麦門冬」を配合した、せきを鎮め、たんの切れをよくするお薬です。

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. 過量服用・長期連用しないでください



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 〈効能・効果〉

せき、たん

## 〈用法・用量〉

次の1回量を1日4回食後及び就寝前に服用してください。

年齢	15才以上	11才以上 15才未満	5才以上 11才未満	5才未満
1回量	3錠	2錠	1錠	服用しないこと

## 用法・用量に関する注意

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) **12才未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。**
- (3) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (4) 錠剤の取り出し方  
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してから服用してください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突きささる等思わぬ事故につながります。)
- (5) 幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないようよく注意してください。

(PTPシートの取り出し図)



## 〈成分・分量〉

1日量(12錠)中

成 分	分 量	はたらき
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	咳中枢に作用し、咳を鎮めます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を広げ、咳を鎮めます。
グアイフェネシン	300mg	痰の切れをよくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	アレルギー性の咳を緩和します。
無水カフェイン	150mg	眠気を防止します。
キキョウ乾燥エキス末 (原生葉換算量600mg)	120mg	咳や痰の症状を緩和する生薬です。
麦門冬乾燥エキス (原生葉換算量1.5g)	300mg	咳症状を緩和する生薬です。

添加物：乳糖、トウモロコシデンプン、カルメロースCa、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg

## 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は次の所にお問い合わせください。

大昭製薬株式会社 おくすり相談室

電話 0748-88-4181 受付け時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

発売元：株式会社プロダクト・イノベーション

富山県富山市浜黒崎239番地

製造販売元：大昭製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168