

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。又、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

総合感冒薬

ペアコールS錠



くしゃみ、鼻水、発熱、頭痛など、かぜの症状がではじめたら、こじらせる前にできるだけ早く治すことが大切です。

ペアコールS錠は、くしゃみ、鼻水など鼻かぜや鼻炎の諸症状に古くから用いられている漢方処方である小青竜湯エキスと、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤、鎮咳剤、去痰剤などを効果的に配合したかぜ薬です。さらに薬による胃腸障害をおさえるために制酸剤も配合されています。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

1. 次の人は服用しないでください

- （1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- （2）本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります。）

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

5. 服用前後は飲酒しないでください

6. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- （1）医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
- （3）高齢者。
- （4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- （5）次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- （6）次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障



2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少※、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、口のかわき、眠気

4.5〜6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能又は効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【用法及び用量】

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	3錠	1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。
11歳以上15歳未満	2錠	
11歳未満	服用しないでください。	



＜用法・用量に関連する注意＞

1. 用法及び用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。


【成分及び分量とその主な作用】

成 分	1日の分量（9錠中）	主 な 作 用
小青竜湯乾燥エキス	900mg	鼻かぜ、鼻炎の諸症状に効果的です。
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛みをやわらげます。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	かぜのアレルギー症状（鼻水、くしゃみ）をおさえます。
シヒドロコデインリン酸塩	24mg	せきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	125mg	のどにからむ痰をやわらかくし、出やすくします。
無水カフェイン	75mg	脳の血管に働いて「かぜ」による頭痛をやわらげ、眠気を防止します。
リボフラビン	12mg	ビタミンB ₂ を補給し、体力の回復をたすけます。
合成ケイ酸アルミニウム	600mg	胃の粘膜を保護し、他成分による胃腸障害をおさえます。

添加物として、トウモロコシデンプン、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。
 ホーユー株式会社 お客様相談室 TEL (052) 935-9941
 受付時間：土・日・祝日及び弊社休業日を除く午前9時～午後5時

販売元
 サンドラッググループ

発売元
 hoyu ホーユー株式会社
 名古屋市東区徳川一丁目501

製造販売元
 ジェピーエス製薬株式会社
 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1