

**成分・分量** 1日量 2包 5.4g 中  
塗活蔵根湯乾燥エキス 4.8g  
ドクカツ…2.0g、シャクヤク…3.0g、カンソウ…1.0g、カッコソ…5.0g、シオウ…  
4.0g、アイヒ…3.0g、マオワ…2.0g、ショウキヨウ…0.5g、タイソウ…1.0g等、9種  
生薬から抽出した満量配合した有効成分です。  
**添加物** ヒドロキシプロピルセルロース、アセスルファムカリウム、ステアリン  
酸マグネシウム、乳糖水和物  
**保管及び取扱い上の注意** (1)直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えておいて下さい。調理の原因になつたり品質が変わることがあります。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読み下さい。また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。



14包 7日分  
1回1包  
1日2回服用

# 五十肩 四十肩に 肩用ラックル® 顆粒

痛みを緩和  
肩・腕の動きを  
回復

飲んで効く

天然生薬100%の漢方薬

第2類医薬品



▲**使用上の注意** 亂相談すること  
1. 次の症状がある場合は直ちに医師又は薬剤師に相談して下さい。(1)医師の治療を受ける人。(2)妊娠又は妊娠している人に相談する人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人)。(4)発熱(体温が弱く下痢しやすい人)。(5)発汗(汗を多く出る人)。(6)頻尿(排尿困難)。(7)次に記載する疾患の既往歴がある人。(8)次の症状を起こしたことのある人。(9)心臓病、高血圧、心筋梗塞、脳梗塞、中風などの既往歴がある人。(10)腎臓病、中耳炎などの既往歴がある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用である可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持つて医師、薬剤師又は販賣店に相談して下さい。

3. 1ヵ月間服用しても症状がよくならない場合は、医師、薬剤師又は販賣店に相談して下さい。

4. 長期服用する場合は、医師、薬剤師又は販賣店に相談して下さい。

関係部位 症 状

皮 ふ

発疹発癢、かゆみ

消化器 食欲不振、胃部不快感

第2類医薬品

痛みを緩和、肩・腕の動きを回復

# 五十肩 四十肩に肩用ラックル® 顆粒

天然生薬100%の漢方薬

開け口

14包 7日分  
1回1包・1日2回服用  
販売名:ラックル顆粒

## 特長

- 五十肩の痛みを緩和し、肩・腕の動きを回復させる顆粒の飲み薬です。
- 五十肩を体の中から改善し、腕を上げられるようになります。
- 天然生薬100%の漢方薬です。
- 肩の血流を促進し、ボカボカ暖める作用があります。
- 眠くなる成分を配合していません。
- 9種の生薬から抽出した有効成分を最大量配合した満量处方です。
- 1回1包・1日2回の飲み方です。

## 用法・用量

成人(15歳以上) 1回1包を1日2回朝夕、食前又は食間に水かお湯と一緒に服用して下さい。又はお湯に溶かしてかき混ぜてから服用して下さい。1ヵ月間毎日飲んで効果がなければ服用を中止して下さい。

15歳未満7歳以上1回2/3包、7歳未満4歳以上1回1/2包、4歳未満2歳以上1回1/3包、いずれも1日2回朝夕、食前又は食間に服用して下さい。

## 用法・用量に関する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## 効能・効果

体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症:

五十肩・四十肩・肩こり・寝ちがえ

販売 日本機器製薬株式会社  
大阪市中央区平野町2-1-2

日本機器製薬 お客様相談窓口 ☎06-6222-0441  
受付時間 9:00 ~ 17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 新生薬品工業株式会社  
奈良県高市郡高取町清水谷1269

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用期限  
製造番号