

腰痛・肩こり痛・関節痛に

芍薬・甘草配合 解熱鎮痛薬

販売名：クイックロコ錠



クイックロコ錠

第②類医薬品

クイックロコ錠は、ACE 処方（アセトアミノフェン、エテンザミドの解熱鎮痛成分および無水カフェイン）に加え、筋肉の緊張をやわらげる芍薬（シャクヤク）エキスおよび炎症をおさえる甘草（カンゾウ）エキス末を配合することにより、腰痛、肩こり痛、関節痛にすぐれた効果を発揮します。また、制酸剤のメタケイ酸アルミン酸マグネシウムを配合しているため、胃にソフトな解熱鎮痛薬です。



使用上の注意 ……

してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります）

- 次の人は服用しないでください
（１）本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
（２）本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくをおこしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
（１）医師または歯科医師の治療を受けている人
（２）妊婦または妊娠していると思われる人
（３）授乳中の人
（４）水痘（水ぼうそう）もしくはインフルエンザにかかっている、またはその疑いのある小児（15才未満）
（５）高齢者
（６）薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
（７）次の診断を受けた人
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 （スティーブンスジョンソン症候群）、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がないなどが持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢などがあらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しいなどがあらわれる。

（裏面に続く）

3. 5～6 回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

効能・効果

- 腰痛・肩こり痛・関節痛・筋肉痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・神経痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

次の量になるべく空腹時をさせて、水またはぬるま湯でおのみください。
また、おのみになる間隔は 6 時間以上おいてください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15 才以上）	3 錠	2 回を限度とする
小児（11 才以上 15 才未満）	2 錠	
小児（7 才以上 11 才未満）	1 錠	
乳幼児（7 才未満）	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 錠剤の取り出し方



右図のように錠剤の入っている PTP シートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出しておのみください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながる可能性があります）

成分・分量


クイックロコ錠は、淡褐色のフィルムコーティング錠で、6 錠（成人 1 日最大量）中に次の成分を含有しています。

成 分	含量（6 錠中）	はたらき
アセトアミノフェン	400mg	熱を下げ、痛みをおさえる
エテンザミド	1000mg	
無水カフェイン	200mg	痛みをおさえるはたらきを助けるほか、頭痛をやわらげる
メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム	300mg	胃酸を中和するとともに、胃の粘膜を保護する
カンゾウエキス末 （原生薬換算量 756mg）	108mg	炎症をおさえ、痛みをやわらげる
シャクヤクエキス （原生薬換算量 756mg）	151.2mg	筋肉の緊張をやわらげ、痛みをおさえる

添加物として トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸カルシウム、ヒプロメロース、マクロゴール 6000 を含有しています。

保管および取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- PTP シートから出して他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり、品質が変化します）
- 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
シオノギヘルスケア株式会社「**医薬情報センター**」
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
受付時間：9 時～17 時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について
（独）医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

販売元
シオノギヘルスケア株式会社
大阪市中央区北浜2丁目6番18号

製造販売元
第一薬品工業株式会社
富山県富山市草島15番1