

ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

目薬

ようがんすい

第3類医薬品

ラスター® 養眼水®

目の疲れ・目のかすみに



【ラスター養眼水の特長】

ラスター養眼水は、血行促進作用、抗酸化作用をもつビタミンEや目の新陳代謝を活発にするビタミンB6、タウリン、目の細胞の働きを促進し、目の疲れを改善するL-アスパラギン酸カリウム、角膜を保護し眼病を予防するコンドロイチン硫酸エステルナトリウムを配合したお休み前にもお使いいただける目薬です。

1日中働き続け、負担をかけた目の疲れをとり、目に栄養と潤いを与えます。



⚠ 使用上の注意



【相談すること】

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人
はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人
緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - 目のかすみが改善されない場合
 - 2週間位使用しても症状がよくなる場合

【効 能 効 果】

目の疲れ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

【用法用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

<用法用量に関連する注意>

- (1) 用法用量を厳守して下さい。なお、就寝より5分以上前の点眼をおすすめします。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5) 点眼用にのみ使用して下さい。



【成分分量】

100mL中

成分	分量	はたらき
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	50mg	目の新陳代謝促進作用があり、眼病を予防します。
酢酸d- α -トコフェロール (天然型ビタミンE)	30mg	血行改善作用により、目への栄養補給を助けます。
L-アスパラギン酸カリウム	500mg	目の細胞の働きを活発にし、目の疲れを改善します。
タウリン	500mg	細胞の代謝を促進し、炎症によって傷ついた目の組織修復を助けます。
コンドロイチン硫酸エステル ナトリウム	500mg	角膜の表面を保護し、目の乾燥を防ぎます。

添加物としてホウ酸、ホウ砂、l-メントール、ゲラニオール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エデト酸Na、クロロブタノール、パラベン、プロピレングリコールを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 表示の期限内にご使用下さい。
(使用期限の範囲内であっても、開封後はなるべく早くご使用下さい。)
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用下さい。



■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室

電話：(0748) 88-3180 (大代表)

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879