

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限(パッケージ側面および缶底に記載)を過ぎた製品は使用しないこと



ハケで塗る ばんそうこう
サカムケア_a



第3類医薬品

液体ばんそうこう

〔販 売 名〕サカムケア_a

特 徴

1. ハケ付きで塗りやすい液体ばんそうこう
2. 「ひび」、「あかぎれ」、「さかむけ」、「小きりきず」などをピタッと固める
3. うすい被膜が、ばい菌の侵入を防ぎ、水に濡れてもしみない
4. 透明タイプで目立ちにくい

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1)ただれ、化膿している患部
- (2)目や目の周囲、粘膜など
- (3)大きなキズ、深いキズ、湿疹および出血している患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

さかむけ、すりきず、ひび、あかぎれ、小きりきず

用法・用量

患部を清潔にし、傷部のみに適量を塗り、そのまま静かに乾燥させてください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 患部やその周辺が汚れたまま使用しないこと
- (2) 患部が汗や水でぬれている場合は水分をよく拭き取ってから使用すること
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (5) 本剤は、外用にのみ使用し、絶対に内服しないこと
- (6) **傷に塗ったとき、一瞬しみますが乾燥するとしみなくなります**
- (7) 使用後にハケを水で洗わないこと(薬剤が水に触れるとゲル状に固まることもある)

成分・分量

100g中

成 分	分 量	はたらき
ピロキシリン	12g	被膜を作り、患部をおおう

添加物として、パルミチン酸イソプロピル、ヒマシ油、d-リカンフル、トコフェロール酢酸エステル、酢酸エチル、酢酸ブチル、ベンジルアルコール、イソプロパノールを含有する

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに必ず密栓して保管すること
(密栓しないと薬剤が固まり使えなくなる)
 - (2) 小児の手の届かないところに保管すること
 - (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
 - (4) 火気に近づけないこと(イソプロパノール含有物)
 - (5) 誤飲(指をしゃぶるなど)のおそれがある場合は使用をさけること
- 急いではがしたいときは、本品を上塗りし、乾かないうちに拭き取ってください
 - 衣類・家具などにつくと、とれにくいので、つかないように注意すること
 - 成分により、ハケや軸の色が変わることがありますが、品質上問題ありません

こんな時に

- 炊事・洗濯で傷口がしみる
- ガーデニングや日曜大工での傷の保護に
- 海水浴やプールでの傷の保護に
- スポーツやアウトドアのちょっとしたケガに
- 靴ズレなどに

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎ 0120-5884-01
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN