

この説明文書は使用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



くらしリズム
MEDICAL
by TSURUHA GROUP

第2類医薬品

ものもらい・結膜炎に 抗菌性点眼薬

サルファアナロン目薬EX

目やにが出たり、まぶたが赤くはれあがったり、涙があふれ出たりするさまざまな症状は、ブドウ球菌や連鎖球菌などの細菌が原因となっている場合が多く、速やかな治療が必要です。

サルファアナロン目薬EXは眼病の原因となる細菌の発育や増殖を抑える作用が長時間持続するスルファメトキサゾールナトリウムに、不快な症状を抑え、回復を助ける3つの成分を配合した目薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 長期連用しないこと

必ずお読みください。



🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。 はげしい目の痛み



2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。


3. 3～4日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

1回2～3滴を1日3～6回点眼してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
(目やにや雑菌等のため、薬液が汚染することがあります。)
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。



裏面もお読みください

効 能

結膜炎(はやり目)、ものもらい、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかゆみ

・「ものもらい」についての注意

まぶたをこすったり、その他、目に刺激を加えないように注意してください。(なお、ものもらいは体質的に起こりやすい場合がありますが、過労や睡眠不足などで体力が低下しているときに起こりやすいので、疲労をさけ、睡眠を十分とるよう心掛けてください。)

成分・分量

成分名	分量	作用
スルファメトキサゾールナトリウム	4.0%	眼病の原因となるブドウ球菌や連鎖球菌などの細菌に対して、強い抗菌力を示し、更にその効果が長く持続する持続性サルファ剤です。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%	抗ヒスタミン作用により、かゆみを鎮めます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.25%	強い消炎作用を示し、目の炎症を鎮めるとともに、抗菌作用を増強します。
タウリン	0.1%	目に栄養を与え、新陳代謝を良くして傷ついた目の修復を助けます。

添加物：エデト酸Na水和物、亜硫酸Na、ホウ砂、パラベン

<成分に関連する注意>

本剤の点眼により口中に苦味又は甘味を感じることがありますが、これは本剤に含まれるスルファメトキサゾールナトリウム及びグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通じて口中に流れて出てくるためで、心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
(目の病気にかかっている人が使用している目薬を他の人が使用した場合、その目薬をとおして感染することがあります。)
- (5)本品は光による薬液の変質を防ぐため着色容器を使用していますが、開封後は携帯袋に入れて光のあたらない所に保管してください。
- (6)車のダッシュボード等高温下に放置しないでください。
(容器の変形や薬液の品質が劣化することがあります。)
- (7)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- (8)開封後はなるべく早く使用してください。又、混濁したものは使用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせください。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室
電話：0120-584-419
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の お問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

企画元：株式会社ツルハグループ・アマ・チャンダイジシグ 製造販売元：小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中鶏1丁目139番地