

## 【使用上の注意】相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚:発疹 / 消化器:胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれる所以あるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 3.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 【用法・用量】

成人(15才以上)1日1回1瓶(50mL)を服用してください。  
○用法・用量を厳守してください。

## 【効能】

○滋養強壮 ○虚弱体質  
○肉体疲労・病中病後・食欲不振・  
栄養障害・発熱性消耗性疾患・  
妊娠授乳期などの場合の栄養補給

## 【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

# 滋養強壮 栄養補給

アナロン  
キング

ANALON KING



第2類医薬品

50mL

## 【成分・分量】50mL中

ローヤルゼリー300mg、ゴオウチンキ0.2mL、イカリソウ流エキス0.5mL、オウセイ流エキス0.5mL、ゴミシ流エキス0.3mL、サンシユ流エキス0.2mL、タウリン1000mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン20mg、チアミン硝化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩30mg、ニコチン酸アミド30mg、カルニチン塩化物50mg、無水カフェイン50mg(アルコール1mL以下)

添加物:カラメル、アルコール、白糖、D-ソルビトール、メタリン酸Na、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール

製造販売元 小林薬品工業株式会社  
岐阜県岐阜市中郷1丁目139番地

お客様相談室 電話:0120-584-419  
受付時間:10時~16時(土、日、祝日を除く)

ガラス:瓶、金属:キャップ

使用期限

製造番号