

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

ビタシーゴールドD(ビタミン含有保健剤)
使用上の注意【相談すること】 1.服用後、次の症状
があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直
ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師ま
たは登録販売者に相談すること/皮ふ・発疹/消化
器・吐き気・嘔吐・胃部不快感 2.服用後、次の症
状があらわれることがあるので、このような症状の持
続または増強がみられた場合には、服用を中止し、こ
の製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相
談すること/軟便、下痢 3.しばらく服用しても症状
がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持っ
て医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
成分・分量 1日量(50mL)中 ペンフォチアミン(ビ
タミンB1誘導体)10mg、リボフラビンリン酸エステル
ナトリウム(ビタミンB2)10mg、ピリドキシン塩酸塩(ビ
タミンB6)10mg、ニコチン酸アミド60mg、無水カ
フェイン50mg、タウリン1,500mg、オキソアミン末
100mg、イノシトール300mg、カルニチン塩化物100
mg、ローヤルゼリーチンキ300mg(生ローヤルゼ
リーとして300mg)、人参乾燥エキス40.3mg(原生薬
換算量600mg)、ジョテイシエキス75mg(原生薬換
算量300mg)、セイヨウサンザシエキス17.5mg(原生
薬換算量70mg)、クコシ流エキス0.2mL(原生薬換
算量200mg)、ブクリョウエキス10mg(原生薬換算
量320mg)、トシシエキス10mg(原生薬換算量100
mg) 添加物：液糖、D-ソルビトール、ハチミツ、pH
調整剤(クエン酸)、香料(エタノール、デンプン部分加水
分解物、バニリン、L-メントール)(アルコール0.5mL
以下)●ビタミンB2により尿が黄色くなることがある。

金属：キャップ
ガラス：びん
50mL

防腐剤無添加

指定医薬部外品

常盤薬品
NOEVIR GROUP

滋養強壮・栄養補給

ビタシー
ゴールド_D

有効成分 **16** 種配合

タウリン 1500mg
ニンニク配合

効能・効果 ○滋養強壮○虚
弱体質○肉体疲労・病中病
後・食欲不振・栄養障害・発熱
性消耗性疾患・妊娠授乳期な
どの場合の栄養補給 用法・
用量 成人(15才以上)1日1
回、1びん(50mL)を服用する
こと。●用法・用量を守ること。
(他のビタミンなどを含有する
製品を同時に使用する場合に
は過剰摂取などに注意するこ
と。) 保管および取扱い上の
注意 (1)直射日光の当たら
ない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手のとどかない所に
保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用
の原因になったり品質が変わる。)(4)期限を過ぎた製
品は服用しないこと。(5)生薬を含むため、まれに混濁
を生じることがありますが、服用には支障はありません。

常盤薬品工業株式会社
NOEVIR GROUP

本社 神戸市中央区港島中町6-13-1
製造販売元 三重県伊賀市白檜字永谷2604-5
お問い合わせは
0120-875-710まで 017070
www.tokiwayakuhin.co.jp KSI204

使用期限
製造番号

