

この説明文書は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

第2 類医薬品

小児用せきどめチュアブル

鎮咳去痰薬

- 小児用せきどめチュアブルは、水なしで飲んで飲めるお薬で、気になるせきを鎮めます。
- お子さまが飲みやすいようにラムネ味にしました。
- 1錠ずつ入っていますので、必要な量を携帯できます。
- せき中枢に作用してせきを鎮める非麻薬性の成分を配合していますので、気管支が弱くてせきが出やすいお子さまに、また、アレルギー性のせきにも効果を発揮します。
- ノンシュガー、ノンカフェインですので就寝前にも服用していただけます。

⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、鎮咳去痰薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

❌ **してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

1. 次の人は服用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、カゼ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気等があらわれることがあります。）

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
(7) 次の診断を受けた人。 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに右記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
アナフィラキシー様症状	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 ……………
口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 変質の原因になりますので、服用にならない錠剤は、裏のアルミ箔をきずつけないようにしてください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

（裏面にも必ずお読みください。）

効能・効果

せき、たん

成分・分量

1錠中、次の成分を含みます。

成 分	分 量	作 用
チベピジンヒベンズ酸塩	3.125mg	せき中枢にはたらき、せきを鎮めるとともに気道液の分泌を促進して痰の切れをよくします。
ノスカピン	2.5mg	せき中枢にはたらき、せきを鎮めます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	3.125mg	気管支をひろげ、呼吸を楽にしてせきを鎮めます。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.25mg	アレルギー性のせきを鎮めます。

添加物：還元麦芽糖水アメ、D-マンニトール、パレイシヨデンブソ、ステアリン酸Ca、ケイ酸Ca、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセートサクシネート、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチルコポリマー、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、アス/ルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、エタノール、トコフェロール、l-メントール、香料

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、尿が赤みがかった色になることがありますが、これは本剤に含まれるチベピジンヒベンズ酸塩によるもので心配ありません。

用法・用量

次の1回量を、1日3回食後、および必要に応じて就寝前にかむか口中で溶かして服用してください。

年 令	11～14才	8～10才	5～7才	5才未満
1回量	4 錠	3 錠	2 錠	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は小児用ですから、服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。）



●お問い合わせは榎屋奇応丸株式会社〈発売元〉まで

お客様相談室 電話：072-871-2990

〒574-0014 大阪府大東市寺川3-3-63

受付：月～金曜日(祝日を除く)9:00～17:30



〈発 売 元〉

榎屋奇応丸株式会社

〒530-0043 大阪市北区天満1-4-11

〈製造販売元〉

日新薬品工業株式会社

〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

榎屋奇応丸ホームページアドレス <http://www.hiyakogian.co.jp>

●他の製品のご案内

- ・かぜの諸症状(発熱、せき・たん等)に⇒**くひやこども総合かぜ薬M**⇒メープル風味の細粒(1～14才用)
- ・症状はせきだけなので、せきの薬を⇒**くひやこどもせきシロップS**⇒せきどめのシロップ剤(3ヵ月～14才用)