



## 第②類医薬品

開け口

12包入  
4日分

コフト<sup>®</sup>顆粒

1. かぜのひきはじめに効く漢方薬の葛根湯と熱・のどの痛み・せきによく効く総合かぜ薬をひとつにした飲むかぜ薬です
  2. 漢方薬の葛根湯と総合かぜ薬のふたつのかぜ薬の相互作用により、かぜを早く治します
  3. 漢方薬の葛根湯は体の免疫力を高めてかぜウイルスに効果を発揮し、ひきはじめのかぜに効きます
  4. 配合の総合かぜ薬は頭痛・鼻水・鼻づまり・くしゃみ・関節の痛み等といった、かぜの諸症状にも効きます
  5. 1歳以上の赤ちゃんから大人まで服用できます
  6. レモン25個分のビタミンC・ビタミンB<sub>2</sub>配合
  7. 漢方薬の葛根湯は体をさらさら温め発汗を促進し、発熱を抑えます

**効能・効果** カゼの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

**用法・用量** 15歳以上の成人1回1包、11歳以上15歳未満1回2/3包、7歳以上11歳未満1回1/2包、3歳以上7歳未満1回1/3包、1歳以上3歳未満1回1/4包、いずれも1日3回、食後なるべく30分以内に、水と一緒に服用して下さい。残った顆粒を保管する場合、顆粒がこぼれないようアルミ袋の開け口を3重に折り曲げ、2日内に服用して下さい。

**用法及び用量に関する注意** (1)用法・用量を厳守して下さい (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい (3)2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先しやむを得ない場合にはご使用させて下さい。

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読み下さい  
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい

A standard linear barcode representing the number 4 987174 721015.

使用  
期限

製造  
業者

副作用被害救済制度 0130-148-831



◎ 台銀商標

理状態でなければなりません。4. 5歳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけて下さい。5. 服薬前後は飲酒しないで下さい。6. 長期運用しないで下さい。

癡病、胃：十一指

【右側面に続きが記載されています】

2. 服用後、次の症候 あらわれた場合は副作用 能性があるので、この直ちに 用を中止し、薬剤師又は担当 医者に相談して下さい。	
関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤・かぶれ
消化器	吐き気・食欲不振
精神神経系 めまい	めまい

販売 日本臓器製薬株式会社  
大阪市中央区平野町2-1-2  
販売元 奈良県高市郡高取町清水谷1269

お客様相談窓口 ☎06-6222-0441 受付時間 9:00 ~ 17:00(土・日・祝日を除く)

卷之三十一