

3

12包入
4日分

特長

コスト 顆粒

1. かぜのひきははじめに効く漢方薬成分の葛根湯と熱・のどの痛み・せきによく効く総合かぜ薬成分をひとつにした飲むかぜ薬です
2. 漢方薬の葛根湯と総合かぜ薬のふたつのかぜ薬成分の作用で、かぜに効きます
3. 漢方薬の葛根湯はひきははじめのかぜに効きます
4. 配合の総合かぜ薬は頭痛・鼻水・鼻づまり・くしゃみ・関節の痛み等といった、かぜの諸症状に効きます
5. 1歳以上の赤ちゃんから大人まで服用できます
6. レモン25個分のビタミンC・ビタミンB₆配合

効能・効果 かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量 次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に、水と一緒に服用して下さい

年齢	成人(15歳以上)	11~14歳	7~10歳	3~6歳	1~2歳	1歳未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包	服用しないこと

残った顆粒を保管する場合、顆粒がこぼれ出ないようにアルミ袋の開け口を3重に折り曲げ、2日以内に服用して下さい)

用法及び用量に関連する注意 (1)用法・用量を厳守して下さい (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい (3)2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用して下さい

4 987174-721015



使用期限

製造番号

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

副作用被害救済制度  0120・149・931

販売 日本臓器製薬株式会社
大阪市中央区平野町2-1-2

製造 新生薬品工業株式会社
販売元 奈良県高市郡高取町清水谷1269

お客様相談窓口 ☎06・6222・0441 受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

® 登錄商標

▲使用上の注意としては、**いけいないこと**（**×**）（守らないこと）と現在症状が悪化したし、副作用・事故が起こりやすいと考えます。

① 次の1は服用しないで下さい（1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー性症状を起すことがある人（2）本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用して嘔吐を起したことがある人（3）本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい（他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮痙薬、鎮静去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等、鎮痙薬、鎮静去痰薬、実物群の薬、アレルギー用薬等）（3）服用後、低血圧等があらわれることがありますので、実物又は機械検査による連射操作をしないで下さい（4）授乳中は本剤を服用しないで下さい（5）本剤を服用する場合は授乳を中止して下さい（5）服用前後は飲酒をしないで下さい（6）長期連用しないで下さい（5）

①、相親する
1. 次の人とは服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師に好まれる薬の投与を受けている人
(2) 妊娠又は妊婦していると思われる人
(3) 高齢者(4) 葉巻などによりカルピル錠一錠以上の煙草の喫食がある人
(5) 高熱、排尿困難の症状がある人
(6) 甲状腺機能亢進症、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、血糖値が低い人
医師を受けた人

【右側面に続きが記載されています】

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、 食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下