

# インドメタロールT

第2類医薬品 (外用鎮痛消炎薬)

## ▲使用上の注意

### ❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の人は使用しないこと  
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)11歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないこと  
(1)目の周囲、粘膜等。  
(2)湿疹、かぶれ、傷口。  
(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 連続して2週間以上使用しないこと



### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

使用期限 製造番号

**効能又は効果** 筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛(五十肩など)、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲(うちみ)、捻挫

**用法及び用量** ライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼ってください。

### 〈用法及び用量に関連する注意〉

(1)用法及び用量を厳守してください。(2)11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(4)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。(5)皮膚の弱い人は、同じ箇所には続けて貼らないでください。

**成分及び分量** 膏体100g(0.70㎡)中 インドメタシン……2.625g  
添加物として、流動パラフィン、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ポリイソブチレン、ミリスチン酸イソプロピル、ジブチルヒドロキシトルエン、1-メントールを含有します。

### 〈保管及び取扱い上の注意〉

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)開封後はファスナーを閉めて保管してください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

■お問い合わせ先 大協薬品工業株式会社  
お客様相談窓口 電話:076-479-1313  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

■副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)



0.8倍ダミー  
4 940794 446010

製造販売元

 大協薬品工業株式会社  
富山市水橋島等173

8枚入(10cm×7cm)



T31